

醫國學入門

七卷上

#13366009III
v. 14

編註醫學入門 七卷上

婦人用藥賦

調經

五葉

崩中漏下

六

帶下

八

癥瘕

九男胎

胎安

臨產

十三

產後

小兒用藥賦

十六驚風

十八積

十八

風寒

十八

痰喘

十九

諸熱

變熱

二十痘疹

外科用藥賦

廿四癰疽

廿八腦疽

廿八

頭瘡

廿八

瘰癧

廿一

痰核

廿一癰瘤

廿一乳核

廿一

乳癰

廿二

肺癰

廿二

肺痿

廿二心癰

廿二瘰生脇下

廿二

胃癰

廿三

腸癰

廿三

男婦陰瘡

廿三便毒

廿三懸癰

廿三

痔

廿五

漏

廿六

男婦陰瘡

廿七囊瘻

附骨疽

廿七

人面

廿七

傷手

廿七

外癰

廿八內癰

瘡疥

廿九

頑癬

廿九

血風

卅一

癩風

卅一大麻

卅一紫雲

卅一

楊梅癰

卅一

疔

卅一

折傷

六 破傷風

七 通用外科

九 洗點敷

辛 藥線

一 取濃

辛 生肌

辛 斷血

二 飲口

二 貼膏

五 拾遺諸藥方

一 雜病婦人小兒外科總方
辛 氣 二 血 三 痰 三 鬱

醫門

士卷上

醫人出藥旗

醫人

醫人

醫人

醫人

編註醫學入門外集卷之七

婦人小兒外科用藥賦製法見本草

婦人之病與男無異經絡氣血只分於胞絡多病瘕瘕胎產

全屬乎衝任調經固經香附四製七製或單製調經散當歸一錢半

麥門冬二錢吳萸肉桂各五分人參平夏白芍川芎牡丹皮各一錢阿膠甘草各七分半姜煎服治經水或前後或

多少或逾月不至或一月再至○小調經散當歸赤芍桂心各一兩沒藥琥珀甘草各一錢細辛麝香各五分為末

酒入姜汁調服五分治敗血停積五臟日久膏膈成水變為浮腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜○周經丸黃芩白

芍龜板各一兩椿根皮七錢黃柏三錢香附二錢半為末酒糊丸梧子大每五十丸酒下治經水過多○四製香附

丸香附一片分四分用酒醋童便鹽水各浸七日焙乾為末醋糊丸梧子大每七十丸空心鹽酒下治經候不調

瘦人加澤蘭葉赤茯苓又合四物湯各四兩加白朮陳
澤蘭葉各二兩黃柏甘草各一兩名十味香附丸○七製
香附丸香附米十四兩分七分一分一分同當歸二兩酒浸
分同義木二兩重便浸一分同牡丹皮艾葉各一兩米泔
浸一分同烏藥二兩米泔浸一分同川芎玄胡索各一兩
水浸一分同三棱北胡各一兩醋浸一分同紅花烏梅各
一兩鹽水浸春三夏二秋七冬十日曬乾取單香附為末
浸藥水打糊為丸梧子大每八十九丸臨卧酒下治諸虛百
損氣血不調月水前後結成癰瘕或骨蒸發熱四肢無力
○單香附丸香附一斤用米泔浸一宿曬乾又以米醋於
砂鍋內同煮旋添旋煮以極透爛為度取焙為末醋糊丸
梧子大每服五十九丸米飲淡醋湯任下專治婢妾氣鬱情
不宜通經多不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心帶下便
血癰瘕或炒焦為丸善止血崩一方加當歸一兩艾葉四
兩名艾附丸○單香附散治胎前產後諸症香附米重便
浸晒畧炒為末每二錢白湯溫酒任下嘔吐泄瀉膨脹飲
食不化加砂仁三分或木香一分義木一兩檀榔各二分藿香
正氣散下吐痰噎食不下諸氣心腹小腹腰痛或結或閉

聚散無時加玄胡索砂仁各四分甚著加莪朮姜黃木香
各二分一應頭痛腦眩加川芎五分茶清下產後惡露不
下臍腹作痛或胎衣不下甚則衝心迷悶加莪朮玄胡索
五靈脂香附木香各七分五續散下○抑氣散香附四兩
茯神甘草各一兩陳皮二兩為末每二錢沸湯調服治婦
人氣盛於血變生諸症頭暈腦滿○墨附丸四製香附一
斤淨綿艾四兩用醋一碗煮二味至乾入石臼內搗爛埋
成餅子於新瓦上焙乾入白茯苓當歸人參川芎熟地續墨
火煨紅醋淬各一兩木香五錢為末醋糊丸梧子大每七
八十丸酒下治婦人久無子而經水不調及素墮胎者亦
効○百子附帶丸四製香附十二兩阿膠艾葉四物湯料
各二兩為末用陳石榴一枚連皮搗碎煎水打糊丸梧子
大每百丸空心淡醋湯下調經養血安胎順氣胎前
產後及月事參差有餘不足諸症悉治久服有孕

通經

導經地黃養陰抑陰或滋陰

通經丸川椒莪朮乾漆當歸
青皮乾姜大黃桃仁紅花桂

心各等分為末用一半和醋熬成膏調餘藥為丸梧子大
每五十丸空心醋湯溫酒下治經候不通臍腹疼痛

成血痕。○導經丸。卽四物湯加官桂、桃仁各一兩、木黃、
兩血竭二錢半、紅花少許、地鷄廿一箇爲末、蜜丸、梧子大
每五十丸、量虛實加減、空心酒下、治經候不通、脘腹連腰
腿疼痛。○養陰栢子丸。栢子仁半、膠卷栢各五錢、澤蘭葉
續斷各一兩、熟地三兩爲末、蜜丸、梧子大、每卅丸、空心米
飲下、治血虛經少或閉、皮熱骨疼、癰瘦脈數。○抑陰地黃
丸。赤芍一兩、生地二兩、北胡黃芩、秦艽各五錢爲末、蜜丸、
梧子大、每卅丸、空心烏梅煎湯下。○柴胡抑肝湯。柴胡二
錢半、赤芍、牡丹皮各一錢半、青皮二錢、連翹、生地各五分、
地骨皮、香附、蒼朮、山桅各一錢、川芎七分、甘草三分、神麩
八分、空心臨卧水煎服。治寡居獨陰、寒熱類瘧等症。○滋
陰百補丸。益母草半斤、當歸六兩、川芎熟地、白朮各四兩、
芍藥三兩、人參、茯苓、玄胡索各二兩、甘草一兩、四製香附
一斤爲末、蜜丸、梧子大、每五十丸、空心砂仁煎湯下、治勞
傷氣血不足、乍寒乍熱、心腹疼痛。乾漆牛膝萬痛立止。萬痛
痛不思飲食、疝羸乏力等症。乾漆牛膝各一兩、爲末、用生地黃汁一碗調勻、入磁器內慢
火熬至半乾爲丸、梧子大、每廿丸、空心米飲溫酒任下、痛

去止藥治月經瘀閉繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調腹中癥瘕等症烏賊蘭茹兩鼻聞馨

烏賊丸烏賊魚骨四兩蘭茹一兩為末雀外清加小豆大

每五丸至十丸鮑魚煎湯下以乾物壓之利腸中也治少

時脫血或醉入房以致血竭肝傷胃膈支滿妨於飲食食

至先聞腥臊臭氣唾出清液或前後泄血月事衰少不來

兼治男子精竭陽事痿弱面無精彩病名血枯蒼葦子宮痰濕堪理蒼葦生蒼木

黃芩二兩為末蒸餅丸梧子大姜湯下調中散鬱一方加

半夏等分名中和丸治濕痰氣熱○清海蒼葦丸南星蒼

木川芎香附作丸服之治肥人痰多占烏藥湯血海疼痛

佳血海地仙因而下多者日必漸愈烏藥

能禁烏藥一錢半香附二錢當歸一錢當歸散桃仁散經

行湛蠲當歸散白木五錢黃芩山茱當歸川芎白芍各一

兩冷者去芩加肉桂為末每二錢空心酒下日三

服治經脉過期不勻或三四月不行或一月再至以致腰

腹疼痛○桃仁散桃仁甘草半夏澤蘭葉牛膝當歸桂

牡丹皮、人參、蒲黃、川芎各五分，赤芍、生地各一錢，姜煎服。
治月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如瀉水，或前或後，
或閉，不來，四肢沉重，欲眠，不能飲食，腹中堅痛，多思酸物。
芎歸丸、桑皮散、水腫、侵尋、婦
丸當歸、人參、太黃、桂心、瞿麥、赤芍、白茯苓各三兩，芎、蘇、一錢
為末，蜜丸，梧子大，每十五丸，空心米飲下。桑皮散、桑白
皮、郁李仁各一錢，赤茯苓二錢，木香、防己、太腹皮各五分，蘇
子、木通、檳榔、青皮各七分半，姜煎服。治脚氣感發，兩脚浮
腫，小便赤澀，腹脇脹滿，氣急，坐卧不得。

血風疼痛，芎藭人參荆芥穗

散，川芎

一錢，羌活、枳殼、甘草各五分，赤茯苓、酸棗仁、桂心、當
歸、木香、牛膝各一分，姜煎熱服。治血風身體骨節疼痛，心
膈壅滯，不思飲食。人參、荆芥散、人參、荆芥、生地、北胡、鱉
甲、酸棗仁、枳殼、羚羊角、白朮各七分半，桂心、川芎、當歸、防
風、甘草各五分，姜煎熱服。治血風體痛，頭昏目眩，心忪煩
渴，寒熱盜汗，頰赤口乾，痰嗽胃滿，或月水不調，脘腹疼痛，
痲痺塊硬，或產後瘦弱，症孕婦禁服。麒麟竭丸、血竭、乳
香、沒藥、白芍、當歸各六錢，虎骨五錢，水蛭、麝香各二錢，為

末酒糊丸。菴豆大，每一錢空心酒下。治寒濕相搏，血滯經絡，痛甚。

耳心

柴胡調經湯羌活蒼朮各一錢獨活菴本升麻各五分。分柴胡七分，乾薑當歸甘草各三分，紅花少許，水煎。

熱服，取微汗。治經水色鮮不止，頭項脊骨強痛，不思飲食。

○烏頭丸：烏頭一兩，芫花乾姜各五錢，俱醋煮乾，再入桂

心、天麻、海桐皮、黑豆各三錢，為末，另用黑豆煮爛搗藥為

丸，梧子大，每七丸至十九丸，黑豆淋酒下，忌一切毒物。治血

風走注，攻刺半身不遂，麻痺搔痒，急風口眼喎斜，語言蹇

澀，手足拘攣。○單蒼朮散：用嫩蒼朮、耳草心、陰乾為末，每一

錢溫酒調服。治血風攻注，血氣乾澀。大黃為血竭，又名血竭。

注頭旋倒，地不知人事。血氣乾澀，大黃為血竭，又名血竭。

膏，錦紋大黃四兩，酒浸，焙乾為末，用醋一碗熬成膏。丸如

鷄子大，每一丸，臨卧熱酒化下。大便秘利，紅脉自下，此治

乾血氣，調經仙藥也。一方加香附子。冷熱癆代四物以丹參。

調服。治經脉不調，產前胎動不安，產後惡露不下，腰脊疼痛，骨節煩疼。

地黃交加血積化水。

後惡露不下，腰脊疼痛，骨節煩疼。

交加散生地一片生薑十二兩各搗自然汁以生地汁

生薑查生薑汁炒生地查署乾焙為末每三錢酒調服治

胎前產後百病榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣血多少

結聚為癥產後中風不能轉側尤妙尋常腹痛亦宜一方

加玄胡索當歸川芎白芍各二兩人參桃仁各一兩半沒

藥木香各一兩香附半斤為末醋糊丸梧子大每五十丸

空心姜湯下名交加地黃丸治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

在松存性經閉如聚散在松即至遊土牛膝當歸尾各等分瓦上焙焦存性為末先

一日白水調服七分五更再進一服即通治經水三年不

行琥珀調經有種

琥珀調經丸香附米一斤分作二分用

者再醋五碗入砂鍋內同煮乾為度入川芎當歸芍藥

熟地生地沒藥各二兩琥珀一兩為末醋糊丸梧子大每

百丸空心艾醋湯下治婦人胞冷無子能令經正

蘇斯求嗣可悅

蘇斯丸香附白

仲厚朴當歸秦艽各二兩防風肉桂乾姜牛膝沙參各二

兩二錢細辛人參各四錢為末蜜丸梧子大每廿五丸酒

下經調受補者服七日即交合孕後忌服

崩中漏下 膠艾當歸龍骨

膠艾四物湯阿膠艾

葉常歸川芎甘草各四分芍藥熟地各八分水酒各半空心煎服治勞傷氣血月水過多或崩漏不止及妊娠胎氣不安或因損動漏血傷胎者亦宜○當歸龍骨丸當歸芍藥黃連槐子艾葉茯苓各五錢龍骨黃柏各一兩木香二錢半為末水丸小豆大每五十丸米飲下治月事失常經水過多及赤白帶下淋瀝妊娠胎動不安夜痛漏下產後惡露不止大人小兒痢疾亦宜**有氣有熱香附橘歸黃芩**備金散香附四錢五靈脂一兩為末每五錢淡醋湯調服治血崩不止○古橘歸丸橘皮四兩當歸一兩為末蜜丸梧子大每五十丸溫酒下治婦人肌膚手足俱有血絲露此怒氣傷肝血失常經故也一方加玄胡索治室女氣血相搏腹中刺痛引心或經行澁少或經事不調○單赤心丸條芩二兩用醋浸七日炙乾又浸又炙如此者七次為末醋糊丸梧子大每七十丸溫酒下治天暫澁靈脂散名紗帽散一五靈脂

烟盡爲末，每一錢溫酒調服。治血崩諸藥不能止，及男子
脾積氣，兼解藥毒。如產後惡血未淨，水酒童便各半煎服。
或心腹脇脚痛，不可忍，只用童便煎服。中風加草烏五分。
同煎，腸風下血，用烏梅、柏葉煎湯調服。如心煩口渴，加蒲
黃，或畏此藥氣者，燒灰服之。尤妙如蛇蝎蜈蚣咬塗傷處，
立愈。○烏紗帽散：漆紗頭巾取，陽氣上行也。赤芍、香附、乾
荷葉、男子髮、當歸、棕櫚各等分，並於新瓦上焙存性，爲末。
每五錢童便調服。如人行十里，久再進一服，卽止。如產後
去血過多，加米醋。
京墨麝香少許。

內補養榮丹號女金

內補當歸丸、當歸
阿膠、白芷、續斷、乾

姜、川芎、甘草各四兩，白朮、吳黃各二兩，肉桂、附子、白芍各
二兩，蒲黃八錢，熟地五錢，爲末，蜜丸，梧子大，每五十丸，溫
酒下。治氣血俱虛，月水不調，或崩中漏下，去血過多，肌體
羸瘦，及月水將行，腹腿重痛。○加味養榮丸：當歸、熟地、白
朮各二兩，芍藥、川芎、黃芩、香附各一兩半，陳皮、貝母、茯苓、
麥門冬各一兩，阿膠七錢，甘草五錢，黑豆炒去皮，四十九
粒，爲末，蜜丸，梧子大，每七八十九，鹽湯溫酒任下。治經脉
參前外，潮內煩咳嗽，飲食減少，頭昏目眩，帶下血風，血氣

久無嗣息一切痰火不受峻補等症服之有孕又治胎前
胎動胎漏常服可無小產之患忌食諸血○女金丹白芍
當歸川芎人參白朮茯苓藁本白芷白薇桂心玄胡索牡
丹皮赤石脂各一兩俱酒浸三日晒乾沒藥甘草各五錢
香附一斤醋浸共為末蜜丸梧子大每五十九溫酒下治
婦人無子或無痰火等疾經事亦調顏容不衰但久無孕
乃子宮有陰無陽不能生發宜服此藥動微陽二月即效
或有經事參後赤白帶下崩中淋瀝及積年血風手足麻
痺半身不遂或血氣心腹疼痛脾虧飲食無味面色萎黃
常作吐逆泄瀉及驀然中風浮腫瘡疥消渴一切虛勞等
症臨產艱難及死胎為丸彈子大用蜜湯化下產後瘀血
眩暈寒熱頭痛無所不治用淡醋湯送下真女中金丹也

帶下

濕熱檮皮加以蒼栢側栢芥栢太米不論赤白

檮皮

丸蒼朮黃栢檮皮海石半夏南星川芎香附乾姜各等分
為末醋糊丸梧子大每五六十丸白湯下暑月去姜加滑
石治肥人白帶是濕痰○側栢檮皮丸檮皮二兩側栢葉
酒蒸黃栢黃連各五錢香附白朮白芍各一兩白芷煨

性三錢為末粥丸米飲下治白帶因七情所傷而脈數者

○本柏檮皮丸黃芩黃柏檮皮滑石川芎海石青黛當歸

芍藥各等分醋糊丸服治瘦人帶下多熱○本木檮皮丸

黃芩白朮各三錢檮皮白芍山茱萸各二錢半白朮黃連

各二錢黃柏一錢半為末酒糊丸溫酒下治孕婦白帶○

本木芍藥丸白朮二兩黃芩五錢紅白葵花一錢半白芍

七錢半為末蒸餅丸煎四物湯下治結痰白帶○龜柏姜

拖丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢拖子二錢半為末

酒糊丸白湯下治赤白帶下或時腹痛○蒼柏辛芍散蒼

朮黃柏辛黃川芎南星滑石半夏牡蠣酒炙水煎溫服治

婦人上有頭風

鼻涕下有白帶帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補

兼治濁淫附桂湯附子三錢肉桂一錢黃柏知母升麻芍

藥各五分黃芪一錢半人參七分水煎服治白

帶腥臭多悲不寐太寒○煖宮丸當歸川芎白芍熟地茯

苓牡丹皮艾葉龍骨牡蠣赤石脂各等分醋糊丸梧子大

每五十九粒醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷無子○苦

練丸又名小煖宮丸苦練肉小茴當歸各一兩為末酒糊

九、梧子大，每五十丸，酒下，治熱入大小腸，赤白帶下。

經固真湯：柴胡、黃芩、郁李仁、甘草各一錢，人參、乾姜各二錢。

錢橘皮五分，白朮花一朵，赤帶換紅葵花，水煎，溫服，治婦人病崩中，日久，白帶下流不止。

○東垣固真丸：黃柏、白芍各五錢，柴胡、白右脂各一兩，龍骨、當歸各二兩，乾姜、白朮各一兩。

末，麴糊丸，梧子大，每十丸，白湯下，少時以早飯壓之，勿冷。

熱藥犯胃也，忌生冷熱酒濕麴，治白帶久下不止，臍腹冷痛，陰中亦然，日中溜火，視物昏花，齒惡熱飲，此皆寒濕乘於胞內，肝經陰火上溢，故目中溜火，其惡熱飲者，陽明經中伏火也，宜此丸。

大瀉寒濕。○平補鎮心丹：茯苓、神五、味子、車前子、肉桂、麥門冬各一兩，二錢半，遠志、山藥、天門冬、熟地各一兩半，酸棗仁二錢半，人參、砂砂各五錢，龍齒二兩半，為末，蜜丸，梧子大，每十丸，米飲下，治思慮太過，心虛不足，或時怔忡，常服安心，腎益榮衛。

虛火烏雞頭、另饒虛滯、烏雞宜、善持。

大烏雞丸：四製香附、一片熟地、四兩生地、當歸、白芍、人參各三兩，川芎、鱉甲各三兩半，白朮、黃芪、牛膝、柴胡、牡丹皮、知母、貝母各二兩，黃連、地骨皮、乾姜、玄胡索各一兩，茯苓各

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

一兩，

二兩半秦光一兩半爲末用白毛烏骨雄雞一隻閉死去
毛腸淨用艾葉青蒿各四兩裝下半在雞腹內將雞光餘
艾蒿同入鑊內以童便和水浸過雞二寸許煮爛取出去
骨焙乾爲末如有筋骨疼痛去肉用骨焙焦爲末與前未
和勻雞汁打糊丸梧子大每五六十丸加至七八十丸溫
酒或米飲下忌煎炒葷菜治婦人羸瘦血虛有熱經水不
調崩漏帶下不能成胎骨蒸等症如月水先期加黃芩黃
連地骨皮月水後期加參朮黃芪白帶加二朮香附升麻
白芷柴胡其雞如得白絲毛烏骨崇冠者尤妙須另於一
處以黃芪炒末爲丸饒之不可近雌雞○小烏雞丸吳萸
良姜白姜當歸芍藥玄胡索故紙川椒陳皮青皮劉寄奴
生地莪朮川芎各一兩荷葉灰四兩北艾二兩爲末用烏
雞肉煮爛爲丸如未曾生育過者戶門油膜包裹子宮因
此不孕者宜加鳳凰衣燒存性七箇硃砂爲衣如腹痛血
黑色者加炒黃連有瘀濕加南星蒼朮香附同九梧子大
每五十九月水不通紅花蘇木酒下子宮久冷茯苓煎湯
下赤帶茶清下血崩豆淋酒調綿灰下胎不安蜜酒下陽
風陳米飲調百草霜下心疼薑蒲酒下漏胎下血烏梅酒

下耳聾腦茶清下胎死不動琥珀三箇煎酒下腰脚痛常
歸酒下胞衣不下芸臺菜研水下頭風薄荷煎湯下血風
眼黑甘草煎湯下生瘡地黃煎湯下身體疼痛黃芪末調
酒下胎前產後白痢草姜煎湯下赤痢甘草煎湯下治氣
塊血塊作痛與葱白
湯間服百病醋湯下琥珀硃砂女子愛
木香當歸沒藥各

四錢乳香一錢麝香硃砂各二分半為末水丸
如龍眼核大每用一丸溫酒磨服治室女帶下白芷地榆

滑者欽白芷散白芷一兩海鯽鮑煨二箇胎髮燒灰一箇
為末每二錢酒調服治赤白帶下一方用白芷六

兩以石灰半斤淹三宿洗去灰將白芷炒焦入板自四兩
或加黃根少許為末粥丸服治崩中白帶○單地榆散地
榆三兩醋水煎服治漏下五色一十二帶一曰多赤二曰
多白三曰月水不通四曰餘餘五曰子臟堅六曰子門閉
七曰交合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子
宮冷十一曰夢與鬼交十二曰子臟不足兼治嘔吐下血

瘕瘕緩治香附海粉連羅開鬱正元而已溫白琥珀暫服

香粉凡香附四兩海粉桃仁白朮各一兩為末神麴糊丸
服治婦人血塊如五石孕難服峻藥○連蘿丸黃連一兩
半用吳更益智各炒過一半去更智羅蔔子一兩半香附
山查各一兩川芎山施三錢莪朮神麴桃仁各五錢為末
蒸餅丸服治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴
嘈雜眩暈身熱時作時止○開鬱正氣散白朮陳皮青皮
香附山查海粉桔梗茯苓玄胡索神麴砂仁麥芽甘草各
等分姜煎服治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛
宜此利氣行血和脾向導○溫白丸皂角巴霜厚朴吳更
紫苑黃連各五錢茯苓人參蜀椒肉桂乾姜柴胡桔梗薑
蒲各一兩川芎二兩半為末蜜丸梧子大每五丸姜湯下
治心腹積聚癥瘕大如杯碗胃脇脹滿及十種水氣痞塞
反胃吐逆並治○琥珀丸琥珀白芍川芎牛膝鱉甲莪朮
當歸厚朴各一兩木香澤蘭官桂各五錢麝香五分為末
酒糊丸梧子大每七十丸米飲下治婦人血痕腹中有塊
攻刺小腹痛重或腰背目引為痛久而不治黃瘦羸乏○
古硝黃膏朴硝大黃各一兩或入麝五
分為末用大蒜搗膏和勻貼積聚處

癥瘕猛攻桃奴桃

仁見親猪肝麝香而巳辰砂神聖代針桃枝散桃枝假犀

糞玄胡索肉桂五

靈脂香附各炒過砂仁桃仁各等分爲末每三錢酒調服
治血蠱及瘀血停積經水不通男子跌損撲傷皆效
金桃仁煎先用醋二升半於磁器內慢火煎減一半入桃
仁大黃末各二兩煮末五錢於內不住手攪可丸時丹
入朴硝末二兩攪勻取出丸如梧子大每五丸五更溫酒
下日午瀉下惡物以盡爲度治經脉不通及血積癥瘕等
症○見親丹附子四錢鬼箭羽紫石英各三錢澤瀉肉桂
玄胡索木香各一錢血竭一錢半水蛭一錢槓榔二錢半
桃仁卅箇三稜五錢大黃二錢爲末酒糊丸梧子大每卅
丸溫酒下治石瘕狀如懷孕○猪肝丸用積猪肝一具入
巴豆五十粒剉在肝內以醋三碗慢火熬令爛熟去巴豆
搗爛入三稜末和丸梧子大每五丸熱酒下治一切癥瘕
刺痛數年不愈者神效○麝香丹麝香當歸木香沒藥桂
心莪朮各五錢芫花槓榔各一兩五靈脂桃仁三稜各三
分同魏一分爲末粳米飯丸梧子大每十丸姜湯下治
癰氣氣滯氣心腹痛不可忍○辰砂一粒丹附子鬱金

橘紅各等分爲末醋糊丸棗核大辰砂爲衣每一丸男酒

下女醋湯下服後又服神聖代針散治氣鬱心疾及小腸

膀胱疝氣痛不可止○神聖代針散乳香沒藥當歸白芷

川芎各五錢青紅蜻蛚去足翅一兩爲末每服一字甚著

五分先點好茶一盞次擦藥末在茶上不得吹攪立地細

細呷之治血積疝氣及心驚欲死小腸氣痛如角弓膀胱

腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血如抱

刺衝心胞衣不下難產及一切痛疾服之神效鬼胎如抱

癰疽玄墜落抱癰疽丸芫花吳萸川烏秦艽柴胡姜蘇巴戟

下惡物立出而愈輕者去芫花巴戟巴戟○古斑玄九斑

猫玄胡索各等分爲末糊丸酒下以胎墜爲度治鬼胎感

於妖魅狀似癰瘰似癰瘰腫似稍箕四香代侵四香散木香沈

一切氣血痛亦効香乳香甘草各

一分川芎胡椒陳皮人參白礬各五錢桂心乾姜砂仁茴

香各一兩太加焙五兩爲末每二錢陳米飲調服忌羊肉

治脾氣血氣血蠱氣血蠱

安胎東胎茶歸爲常用安胎當歸湯

氣血蠱水蠱石蠱

當歸川芎各

八分人參阿膠各六分棗子艾葉水酒煎服治舉動驚悸胎動下墜腹痛下血○古杜續丸杜仲續斷各二兩為末棗肉九梧子大每卅九米飲下治胎動腰痛宜此防其欲墮○東胎丸黃芩二兩寒月減五錢白米二兩陳皮三兩茯苓七錢半為末粥九梧子大每三四十九白湯下八箇月可服○古芩木湯子芩二兩白米五錢水煎服一方用芩木等分為末粥九梧子大每五十九白湯下名安胎丸治四五月常墮不安內熱其故也古方一月用烏雞三個月用赤雄雞十月用猪腰子餘月用鯉魚煮汁煎藥尤妙○金匱當歸散黃芩白朮當歸川芎白芍各一兩為末每二錢酒調服或酒糊為丸茶清下此方養血清熱孕婦宜常服之如瘦人血少有熱胎動不安素魯半產者皆宜服之以清其源長胎瘦胎歸地枳甘並行川芎阿膠生地各六分當歸一兩牡蠣二分川椒三分為末蜜丸梧子大每卅九米飲下治孕婦宿有風冷胎寒不長或將理失宜傷動胎氣多致損墮常服益血保胎調補衝任瘦胎枳甘散枳壳五兩粉草二兩半為末每二錢白湯點服或加香

附一兩尤妙治八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑胎易產益血舒氣若稍弱者恐致胎寒腹痛胎弱多驚當佐以歸地木香爲丸用之則胎漏者膠艾補中止血

陰陽調和有益胎嗣

艾葉二兩水煎服治跌撲傷損動胎或胎上搶心腹痛下

血膠艾芍歸湯阿膠艾葉川芎當歸各一錢甘草二分

水煎服治胎動不安或下血在八九箇月內少加砂仁

芎歸補中湯川芎當歸赤芍黃芪白朮各七分阿膠五味

子乾姜各四分人參杜仲甘草木香各三分水煎服治胎怯者

服治氣血虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮

參朮益氣救生

益氣救生散人參白朮陳皮訶子神麴各等分爲末每二錢水煎服治胎氣未怯不

宜瘦胎合服此藥

惡阻旋覆胎自保

錢厚朴白朮枳殼黃

芩茯苓各三錢芍藥半夏麴生薑各二錢水煎服忌葷腥

錫醋生冷治孕婦六七月間胎動惡阻嘔逆酸水惡食多

臥保胎飲當歸川芎芍藥熟地半夏茯苓甘草白朮黃芪阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安腹腸疼痛

或時下血及惡血
一切等症並治
瘧痢厚朴能醒脾飲子厚朴甘草豆

甘草一分姜黃煎服治子瘧子痢口淡及魚
傷風冷兼治老人氣虛便閉少津液引飲
子痢芎活

羊角湯趁羊角獨治酸棗仁五加皮各五分薏苡仁防風
當歸川芎枳殼杏仁各四分木香甘草各二分半姜

煎服治孕婦中風頭項強直筋脉拘急言語蹇澀痰涎不
利或時發搐不省人事各口子痢○古芎活散川芎羌活

各等分水煎入酒少許溫服胎
前安胎產後逐惡血下胞木
子氣防已天仙藤防已散

錢桑白皮赤茯苓紫蘇各二錢木香五分姜煎服治妊孕
腫滿喘促小便不利○天仙藤散天仙藤即青木香藤香

附烏藥陳皮甘草各六分姜煎入紫蘇木瓜各三片同煎
日三服腫消止藥治孕婦兩足漸腫以致胎悶飲食不美

甚則脚指間有黃
水出名日子氣
臨產芎歸黑神來甦無憂橫逆
古芎歸

當歸各二錢水煎入酒溫服治胎前產後腹痛體熱頭疼
諸疾及男子一切去血尤宜如孕婦因事藥猛着胎或子

人門卷七

死腹中惡露將下疼痛不已口禁欲絕者用酒煎乾再入
水煎一二沸灌以探之若不掇則痛止子母俱安若胎頓
立便逐下如難產倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白
童便各一盞藥四錢煎服如胎產五七日不下垂死及矮
石女子交骨不開者加龜板并生育過婦人頭髮燒灰為
末每三錢酒調服古黑神散百草霜白芷各等分為末
每二錢水煎入童便米醋少許調服治橫生逆產瘦胎及
胎前產後虛損月水不止崩漏等症○來甦散木香神麝
陳皮麥芽黃芪阿膠白芍各一錢芩根甘草各二錢糯米
一合半氣弱加生薑煎抗口灌之連進為妙治臨產用力
太過氣脉衰微精神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省
人事○無憂散當歸川芎白芍各一錢枳殼五分乳香髮
灰各三分木香耳草各一分半水煎服治
胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難生 催生三退六一
返魂兔腦神靈 三退散蛇退一條蟬退十四枚男子頭髮
雞彈大俱燒灰為末分三服酒調下治橫
逆難產子死腹中○三退六一散蒼朮散一兩男子髮一
團用香油熬化蛇退一條蟬退五枚穿山甲一片各燒存

性為宋用蠶水煎二沸入麩灰拌勻服之催生神效
鬼丹即單益母膏九端牛日採紫花方莖者連根洗淨於
石臼內搗爛以布漚取濃汁入砂鍋內文武火熬成膏如
砂糖色為度磁罐收貯每服一匙或陰乾忌鉄為末蜜九
彈子大每服一丸照後湯使下一方用益母草半斤加當
歸赤芍木香各二兩為末蜜九梧子大每五十九丸白湯下
名加味益母丸服百日有孕催生用童便下如胎前臍腹
刺痛胎動不安下血不止米飲或秦艽當歸煎湯下胎前
產後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如瘧疾者米湯下臨
產并產後各先用一丸童便入酒下定規魄血氣自然調
順諸病不生又破血痛養脉息調經終功効不能盡述產
後胎衣不下落在胞中及臨產一切產難橫生不順死胎
經日不下脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下產後中風牙關
緊急半身不遂失音不語童便入酒下產後氣喘咳嗽胃
膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力者
溫酒下產後太陽穴痛呵欠心怔氣短肌體羸瘦不思飲食
血風身熱手足頑麻百節疼痛溫米飲下產後眼前黑
暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神不省人事薄荷自然汁

或薄荷煎湯下或童便酒各半下產後面垢顏赤五心煩
熱或結血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便入酒或
薄荷湯下產後惡露結滯臍腹刺痛惡物上衝心胃滿悶
及產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力虛腫自汗不
止月水不調久而不治則為腎蒸之疾或鼻衄口乾舌黑
俱童便入酒下產後二便不通煩燥口苦薄荷湯下產後
痢疾米湯下產後漏血棗湯下產後赤白帶膠艾湯下血
崩漏下糯米湯下勒乳痛或成癰為米水調塗乳上一宿
自瘥或生搗敷亦好婦人久無子溫酒下服至一月決有
効驗○兔腦丸兔腦一枚鼠肉腎母丁香益母草
各一錢乳香一分麝香一字為末兔腦或兔血和丸茶實
大硃砂為衣油紙封固陰乾每一丸破水後醋湯或赤小
豆煎湯下即產隨男左女右手握藥出是驗凡產難日久
水乾服黑神瀝藥又多最宜兔腦滑之倉卒以免皮毛燒
灰酒調服方寸七亦好又能下胞衣○龜壳散龜壳一箇
生過男女婦人頭髮一握燒存性川芎當歸各一兩為末
每二錢水煎服良久生胎死胎俱下治產死胎霹靂如聖
五七日不下垂死及矮右女子交臂不開死胎霹靂如聖

霹靂丹 蛇退 一條 蠶退 二錢 男子 髮 路上 左腳 草鞋 各一
錢 各燒 存性 乳香 五分 黑鉛 二錢 半 水銀 七分 半 為末 用
債猪心血 和丸 如梧子 大 金銀 箔 七片 為衣 每二丸 倒流
水 灌下 或入 伏龍肝 調下 土着 兒頭 戴出 為妙 治 臨產 驚
然 氣痿 目翻 口禁 面黑 唇青 口中 沫出 子母 俱損 兩臉 微
紅 子死 母活 如聖 膏 巴豆 十六箇 草麻子 四十 九箇 麝
香 二錢 共搗 如泥 攤絹 帛上 如胎 死腹中 貼臍上 一時 產
下 即時 揭去 如胞衣 不下 貼脚心 胞衣 下即 洗去 若稍 遲
腸便 出即 移此 膏塗 頂上 即入 古桂 香丸 肉桂 下兩 麝
香 一錢 為末 飯丸 菉豆 大 每十五 丸 小兒 七丸 白湯 下治
大人 小兒 過食 瓜菓 腹脹 氣急 一方 胞衣 奪命 流形 奪命
戒桂 五錢 加 琥珀 一錢 半 善下 死胎 胞衣 奪命 流形 奪命
黃附子 牡丹 皮 乾漆 各等 分 醋煮 大黃 膏為丸 梧子 大 每
十五 丸 至廿 丸 溫酒 下治 產後 血入 胞衣 脹滿 衝心 久而
不下 或去 血過多 肺氣 喘促 先取 鞋底 炙熱 熨小腹 次進
此藥 奪命丸 牡丹 皮 桃仁 茯苓 赤芍 桂心 各等 分 為末
蜜丸 彈子 大 每十九 醋湯 化下 或葱 白煎
濃湯 下丸 妙 連進 兩丸 胎死 腐爛 立出 產後 補虛 當歸

羊肉內炙睪丸

補虛湯人參白朮各一寸錢當歸川芎黃芪陳皮各五分甘草二分姜煎服治產後一切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓參之熱甚

者加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能利肺氣與補陰藥同意曾誤服熱藥及熱食者少加酒芍藥服之小參當歸散當歸熟地白芍人參麥門冬肉桂各一錢先以梗米一合淡竹葉十片水二盞煎至一盞去米竹葉入前藥并姜棗煎溫服治產後去血過多血虛則內熱心曾煩滿吸吸短氣自汗頭痛悶亂喘時轉甚○當歸羊肉湯人參當歸各七錢黃芪一兩生姜五錢用羊肉一斤或代以猪腰煮清汁五盞去肉入前藥煎作六服早晚頻進治產後發熱自汗肢體疼痛各日煮勞○羊肉湯精羯羊肉二兩當歸陳皮各一兩生姜五錢水煎入酒調服加葱鹽亦可治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及冬月生產寒氣入於產門臍下脹滿此寒病也○內炙散藿香葉丁香皮茴香肉桂熟地各一兩半甘草白朮當歸山藥白朮各八兩藁本乾姜川芎黃芪白芍木香各一兩陳皮四兩每三錢姜艾煎服或為末溫酒調服治胎前產後一切血疾血崩虛僂

腹脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下
五色腹中虛鳴氣滿堅硬瀝血腰疼口吐清水頻產血衰
顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈血痛
時發疼痛頭目眩暈惡血衝心悶絕昏迷惡露不止體虛
灰汁手足逆冷等症如產後下血過多加蒲黃惡露不淨
加當歸紅花嘔加生薑上熱下冷加荊芥○脫胎九良姜
姜黃薑澄茄陳皮莪朮人參三棱各等分爲末用蘿蔔煮
爛搗汁煮糊九梧子大每五十九蘿蔔煎湯下治產後血
氣衰弱飲食停積口乾煩悶心下痞痛
產後血暈四味七珍清魂調經散
芫花蘆白礬雄黃等分爲末每用少許吹鼻是內服白礬
湯治產後血厥而胃○四味散當歸玄胡索血竭沒藥各
五分童便煎服治產後一切諸疾繞方分燒宜服如心膈
寒倍當歸氣悶需急倍玄胡索惡露不快倍血塊心腹痛
甚倍沒藥○七珍散川芎人參菖蒲生地各一兩防風辰
砂各五錢細辛一錢爲末每一錢薄荷煎湯調服治產後
虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不明又心氣通於舌
心氣閉塞則舌亦強矣故令不語○寧神膏辰砂乳香各

五錢酸棗仁人參茯苓各一兩琥珀七錢半為末燈心麥
子煎湯調服一錢或蜜丸彈子大薄荷煎湯化服一丸治
失血過多心神昏悶言語失常不得睡卧清魂散荆芥
四兩川芎二兩澤蘭葉人參各一兩甘草八錢為末每二
錢熱湯溫酒各半調服灌下治產後血暈昏不知人單
荆芥散一味焙乾為末每二錢黑豆酒調服治產後中
風牙關緊急手足瘳癱或麻油燈上燒焦童便調服治崩
中不止○古荆歸湯荆芥當歸身尾各等分為末每服三
錢黑豆酒調服或童子小便亦可口緊者拭開灌之或
吹鼻中甚効一方用蜜丸或麪糊丸如梧桐子大每服五
七十丸空心米飲下治產後神風不省人事口緊牙關緊
急手足瘳癱如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或
築心眼倒吐瀉欲死宜此清神氣通血脈其効如神○大
調經散大豆一兩半炒去皮茯苓神一兩琥珀一錢為末每
三錢濃煎烏豆紫蘇湯調服治產後血虛惡露未消穢氣
未平敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿

白薇黑龍鬱冒汗多便秘

白薇湯白薇當歸各六錢人參
三錢甘草一錢半分二貼水煎

服治產後冒弱不食脉微多汗亡血發厥驚冒等症。龍丹當歸川芎半地良姜五靈脂各二錢細剉俱入砂確子內紙筋益泥固濟火煨通紅候冷取出入百草霜一兩硫黃乳香各二錢琥珀花藥石各一錢為末醋糊丸彈子大每三九炭火煨令通紅投入生薑自然汁內浸碎之以童便合酒灌服治難產或胎衣不下產後血暈妄言見鬼及血崩惡露不止腹痛血腫血風身熱頭痛類瘧一切危症服之神効。

心疼

桂心湯桂心小草吳茱萸乾姜獨活熟地當歸白芍各一錢身草細辛各三分水煎服治素有宿寒因產大

虛寒搏於血血凝不散上衝心之絡脉故作心痛。木槧湯木杏槧榔玄胡索金鈴子三棱莪朮厚朴桔梗川芎當

歸白芍黃芩甘草各等分水煎服。惡露不斷烏金調酒或治產後七情感傷血與氣併心痛。

牡蠣

烏金散麒麟竭百草霜男子亂髮灰松墨煨醋淬鯉魚鱗燒灰玄胡索肉桂當歸赤芍各等分為末每二

錢空心溫酒下治產後敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭目昏眩無力。牡蠣散牡蠣粉川芎熟地茯苓龍骨各二

鐵續斷當歸艾葉人參五味子地榆各一錢甘草五分分
二貼姜棗煎空心服治產後惡露淋瀝不斷心悶短氣四
肢乏弱不思飲食頭目昏冷熱諸淋白茅為君共茯苓白
湯白茅根五錢瞿麥白茯苓各三錢半萊子人參各一錢
一分半蒲黃桃膠滑石半夏各七錢半甘草五分紫貝一
箇煨石首魚腦砂二箇煨分二貼姜二片煨心廿根水煎
服或為末每二錢木通煎湯下如氣壅木通橘皮煎湯下
治產後諸淋無問
冷熱膏石氣等淋氣塞少乳漏蘆散
存性為末每二錢酒調服仍食熱羹湯助之治婦人肥盛
氣脹壅塞乳汁不行或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫
欲成膿者氣滯少乳湧泉名
湧泉散瞿麥麥門冬王不留行龍
腰者氣滯少乳湧泉名
下先食猪懸蹄菱後服此藥服後以熈利左右乳房又
方王不留行白丁香漏蘆天花粉姜蠶等分為末猪懸蹄
煮汁下兼治乳癰
脹痛及乳癰腫意婦性最險而驚陰道竭虧難成

幼科未載素問扁鵲始稱兒醫夾驚夾積是主出麻出痘

尤奇兒病與太科相同惟百病多夾驚積與出麻痘為異耳驚則利之涼之溫之辰

砂龍腦救急利驚丸天竺黃滑石各一錢半牛黃南星半夏輕粉各一錢天麻硃砂青黛韭地蛭蚓糞

各三錢白附子雄黃山查各一錢半蟬退全蝎姜蠶各七枚芽草巴霜各五分麝香八分金箔卅片為末麪糊丸蘿

蔔子大分作五處用金箔硃砂滑石青黛雄黃各為衣每下歲至三歲服五丸五歲至九歲服七丸十歲至十三歲

服十丸諸驚風薄荷煎湯下痰多用滑石為衣的食疾用雄黃為衣的餘症白朮下治急驚風症并廿四驚水瀉痢

疾痰火腹脹食積諸般雜症服之有積則行有驚則利服後宜服啓脾散啓脾散蓮肉一兩白朮茯苓山藥神麪

山查各五錢人參猪苓澤瀉藿香木香當歸白芍砂仁各三錢肉豆蔻三箇陳皮二錢甘草一錢驚風後加辰砂滑

石各二錢為末任意姜湯調服初生兒塗乳頭上服之百病愈後俱用此藥調脾為主○大利驚丸南星二錢白附

子牙硝天麻五靈脂全蝎各一錢輕粉五分巴霜一字爲末糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯下治小兒驚風肚脹臍腫身體重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發爲風搐及釣腸鎖肚撮口內氣引痛腸胃鬱結不通宜此正痰利驚○東驚丸青黛草龍膽各三錢鈎藤二錢防風黃連各五分牛黃龍腦麝香各一字爲末糊丸粟米大每一三五丸金銀煎湯下治驚熱胎驚發搐心神恍惚牙關緊急上視潮熱手足動搖握拳抽掣○小東驚丸鬱金二箇用皂角水浸黃連牙硝木香藿香龍膽草各五錢全蝎六箇爲末糊丸麻子大雄黃麝香硃砂金銀箔爲衣每五七丸風痰驚熱用麻仁防風蟬退潮熱桃柳枝真驚薄荷燈心夜啼燈心薄荷窰心土盤腸鈎氣天鈎鈎藤吐藿香瀉木瓜陳皮白朮白姜粟壳赤朮甘草烏梅太便開枳壳硝黃咳嗽烏梅桑白皮吐不止丁香末効黃荆葉精神不爽冬瓜仁常服金銀薄荷俱煎湯下治驚熱恍惚四肢抽掣潮熱昏迷乍熱乍醒或爲驚恠所觸而致陽症驚癇○溫驚丸人參辰砂赤石脂茯苓各五錢白朮一兩山藥二兩乳香麝香各二錢爲末蜜丸芡實大每一丸薄荷煎飲化

下治胎寒腹痛乳便青乳食不化○大溫驚丸人參茯苓白朮辰砂麥門冬木香代赭石各五錢甘草酸棗仁各一兩姜蠶桔梗各二錢半全蝎五箇金銀箔各六片爲末蜜丸棗豆大重兒大小服之○急驚潮熱薄荷竹茹慢驚冬瓜仁夜啼蜜心土搐搦防風傷風荆芥疹痘蟬退常服金銀薄荷俱煎湯下治心熱煩燥夜啼常用安神定志去驚如驚風已退神志未定者加琥珀遠志○珠銀丸水銀蒸棗肉研如泥全蝎各一錢白附子一錢半南星硃砂片服各一字天漿子牛黃犀角麝香各半分鉛霜五分和米銀研姜蠶七箇爲末粟米糊丸芥子大每一九薄荷煎湯下利去胎中蠱毒爲度未利再服治小兒臍風口緊眼翻下切胎風胎毒痰盛壯熱亦治驚積宜量用之○辰砂膏辰砂三錢硼砂馬牙硝各一錢半玄明粉二錢全蝎真珠末各一錢麝香一字爲末油紙封裹自然成膏每取一二豆許金銀薄荷煎湯下潮搐耳草煎湯下月內兒乳汁調敷妳上令吮之治口緊眼閉啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通○辰砂化痰丸辰砂枯礬各五錢南星一兩半夏麩三兩爲末姜汁煮麩糊丸梧子

大另用長砂爲衣每十丸姜湯下亦治風壅小兒痰嗽生
姜薄荷煎湯化下一丸治風化痰安神定志利咽膈清頭
目止咳嗽除煩悶○龍腦安神丸茯苓三兩人參地骨皮
甘草麥門冬各二兩桑白皮犀角各一兩牛黃五錢龍腦
麝香各三錢硃砂牙硝各二錢爲末蜜丸彈子大金箔十
五片爲衣每一丸冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
治五種顛癇發作無時及羣勞發熱咳嗽語澁舌強○金
箔鎮心丸全蝎七箇用薄荷葉包縛慢火炙乾天麻防風
羌活牛黃赤茯苓犀角甘草辰砂麝香各一錢爲末蜜丸
皂子大金箔廿片爲衣每一三丸薄荷煎湯化下鎮心解
熱退驚安神除煩燥止夜啼○天麻防風丸天麻防風人
參各一兩全蝎七箇姜蠶粉草各五錢雄黃硃砂各二錢
半牛黃一錢麝香五分爲末蜜丸梧子大每一丸至二九
薄荷煎湯化下治撮口疳風及一切驚風身熱多瞞驚悸
手足搐掣精神昏憤痰涎不利及風濕邪熱並宜一方去
牛黃用入參或冬瓜仁煎湯下治慢驚不省手足微動眼
上視昏睡○轉驚丸人參防風白附子姜蠶全蝎各一錢
南星天麻各二錢爲末麝香糊丸梧子大每十丸姜湯下

治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷痺洞泄積則消之化之下
及吐瀉久病轉成慢驚身冷癰瘰等症

之紫霜白玉攸宜

消積丸丁香砂仁各十二箇烏梅肉巴
豆肉各三箇史君子五箇為末煎丸

子大每三九橘皮煎湯下治乳食傷積心腹脹滿氣喘壯
熱或嘔或瀉木香丸木香莪朮砂仁青皮硃砂代赭石
各二錢丁香巴豆肉各一錢為末飛麝香丸麻子大每三
九乳積乳汁下食積米飲下後與大異香散氣積橘皮煎
湯下後與流氣散子紫霜丸代赭石赤石脂各一兩杏
仁五十粒已霜廿粒為末蒸餅丸粟米大每三九或十九
量兒大小米飲乳汁任下以利為度未利再服治食積腹
脹身軟腰強眼緩宜先用此取積並不虛久又治變蒸發
熱不鮮并挾傷寒壯熱汗後不解及乳哺失節胃有痰癖
宿食乳則嘔吐先寒後熱或內挾冷食大便酸臭兼治驚
積九兒有熱不欲飲乳渴目不安此皆發癰之漸印以此
九瀉之時間量與此裁其盛勢則無驚風鉤癰之患白
玉餅白附子南星滑石輕粉各一錢巴霜十九粒為末麝
香丸菜豆大捏作餅二歲一九五歲二九葱湯化下治腹

中有癖但飲乳嗽而生痰及急慢驚風癰瘡潮搐壯熱痰涎壅盛一方去輕粉南星白附子用半夏十二箇巴霜五十粒滑石寒食麩各一兩水煎姜湯下治脾氣不足乳食不消吐瀉驚悸肚腹潮熱咳嗽痢疾等症

風寒感

傷寒活大青膏當黃

傷寒膏天麻赤茯苓各五錢羌活防風各二錢半人參全蝎酥砂硫黃水

銀各一錢朱以硫黃水銀同研如泥次以餘藥同為末蜜調成膏旋九草子大每一丸煎薄荷湯化下治傷寒陰症及脾虛生痰肝熱生風或吐瀉後成慢驚○大青膏天麻青黛各一錢白附子一錢半蝎稍烏蛇肉各五分酥砂磨香天竺黃各一字為末蜜調成膏每服半草子大月中兒粳米大煎薄荷湯化下五歲已上煎甘草飲下治傷風發熱熱則生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故也大小便調口中氣熱宜此發之○大黃九大黃一兩黑丑五錢川芎五錢甘草一分為末糊丸麻子大每一十九量兒大小虛實蜜湯下以微利為度治風熱內實口中氣熱大小便閉飲水不止有

痰喘

咳嗽亭半百部丸可為

亭牛丸葶藶黑丑杏仁防己各

等分爲末，棗肉丸。麻子大，每五七丸。淡姜湯下。治乳食衝肺，傷風咳嗽，面赤身熱，痰盛喘促。○百部丸。百部、麻黃各三錢，杏仁四十箇，爲末，蜜丸。皂子大，每二三丸。溫水化下。治感寒，聲微喘。

生犀紫陽連翹飲

能實變蒸諸熱

小生犀散。犀角一錢，地骨皮、赤芍、柴胡、乾

蒸肌熱、瘦悴、煩赤、口渴、哺熱、盜汗、五心煩熱。○紫陽黑散。麻黃、杏仁各一兩，大黃五錢，俱燒存性，爲末。每丁字乳汁調或水煎，抱兒於溫煖處連服，微汗身涼即愈。治變蒸解利熱氣。○連翹飲。連翹、瞿麥、滑石、車前子、牛蒡子、赤芍各一分，山桅仁、木通、蟬退、當歸、防風各半，小黃芩、荆芥各一分半，柴胡、甘草各二分，水煎服。即八正散加葶治小兒諸熱。表裏俱宜。如風熱、痰熱、變蒸熱、肝熱、大腸熱、癰疹熱，加麥門冬、用熱實熱、血熱三焦熱、小腸熱，加大黃、燈心、麻痘熱、溫氣熱已出未出症，熱加紫草、當歸、餘毒熱、胎熱、肺熱、傷寒後瘡疹後，餘毒發熱，加薄荷、項上生核、熱癰、癰毒熱，加大黃、朴硝。○寬熱飲。枳殼一兩，水浸去穢，以巴豆四十粒同炒黃去巴。大黃一兩，朴硝五錢，甘草一錢，爲末。

每三五分薄荷煎湯調服當利下如鼻涕或成塊腥臭惡

物治小兒驚熱天鈞手足攣攣肚腹有熱兼治食積乳癖

生痰動氣**天乙**觀音銀白散善調虛弱胃脾**天乙**九燈心丁片

為末入水盪之湯者為燈心取出入藥二兩半赤白茯苓

兼茯苓共五兩滑石猪苓各五兩澤瀉三兩為末用入參

丁片煎膏丁方用入參白朮各六兩甘草四兩同煎膏和

丸如龍眼大硃砂為衣金箔裹之每一丸隨病換引化下

大段小兒生理本天一生水之妙凡治病以水通利為

捷徑也此方清心利便所以散火也凡小兒蘊熱丹毒驚

風痰熱變蒸發熱之症用之最當而嘔吐瀉痢諸症無不

治也○觀音散人參丁錢蓮肉神麩各二分茯苓一分半

白朮黃芪木香白扁豆甘草各一分姜棗煎服治外感風

冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進飲食久執羸弱丁方加防風

羌活天麻全蝎各全蝎觀音散治吐瀉後慢脾風甚者加

川烏○銀白散升麻知母山藥白扁豆人參白朮茯苓甘

草各等分為末每一錢沸湯調服治小兒百病加減由人

如慢驚搐搦麝香飯湯下急驚定後陳米湯下驚吐不止

丁香煎湯下天桂骨倒脚軟濃米湯下夾驚傷寒薄荷煎湯下白煎湯下疳氣肚脹氣急多渴百合煎湯下壯熱面赤驚風金銀薄荷煎湯下赤白痢不思食及諸病後倦怠不思食姜棗煎湯下喫食不知饑飽不長肌肉麥芽生薑煎湯下暴吐紫蘇木瓜煎湯下神形脫語言不正及大人吐瀉麝香葉煎湯調服若稟受氣怯小兒可每日服一服最妙

痘初消毒加地皮快斑透肌如四聖

消毒散鼠粘子八分荆芥四分甘草二分

水煎溫服治痘欲出未出已出壯熱未微咽痛胃緊便秘及痘後一切瘡毒赤腫等症急進三四服快透消毒應手神效惟內虛便利者忌用如虛熱加地骨皮壯熱加黃芩紫草實者加生犀磨汁痘已出未勻裁荆芥三分出不快及痒加蟬退有汗加防風裁食加人參山查便秘加大黃氣虛加參木血虛加芎歸百般加裁由人參快斑散紫草蟬退人參芍药各五分木通二分甘草一分水煎服治痘出不快一方去木通加穿山甲等分治痘已出被風復入透肌散紫草一錢升麻甘草各五分糯米五十一粒水煎服治痘已發不快解毒清熱涼血加蟬退地骨皮酒茶

如聖湯白芍升麻乾薑各五分甘草紫草木通各二分半
山查根三十姜葱煎熱服治瘡瘡已出未出身熱如火頭
疼臉赤呵欠鼻瘡如心煩加麥門冬赤茯苓煩渴合生麻
散身熱如火加酒淬地皮○四聖散紫草木通各一錢枳
壳甘草各五分水煎溫服治瘡出不快及倒腐陷伏惡候
毒氣入內腹脹弱赤如氣弱去枳壳加黃芪○加味四聖
散紫草木通木香黃芪川芎甘草人參各等分蟬退截半
每二錢水煎服治瘡出不快及變陷倒腐小便赤澀餘熱
不止除一切惡候或瘡出被風吹復不見入皮膚內發
熱不散如便閉加枳壳便調加糯米能解毒發瘡也瘡出

解毒紫草活血勾氣勝萬金

解毒防風湯防風五分地

穗肩粘子各二分半水煎溫服治瘡七日後并熱盡盛氣
弱瘡出不快及瘡出而聲又紫草食紫草一二兩用百
沸湯一碗沃之以物蓋定勿令泄氣俟溫量兒大小服之
雖出亦輕治瘡發未出或瘡一熱出齊服此重變輕惟
便利者忌服或加陳皮葱白尤妙如發瘡疹加釣藤酒調
服○紫草膏紫草白附子麻黃甘草各五錢全蝎甘草姜

蠶八箇蟾酥一錢爲末另用紫草一兩煎膏入煉蜜二兩
酒半盞攪勻和丸菜豆大每一丸治痘已出不快及驚風
癩疾如初發熱重者敗毒散化下初發驚狂者薄荷葱白
燈心煎湯下色紅紫黑隨紫草煎湯下色淡白灰隱熱酒
下加味紫草散紫草白芍麻黃甘草各五分水煎溫服
治痘出未透如年壯及北方皮厚之人加蟾酥辰砂蓋紫
草解毒府黃發汗固能發痘佐以辰砂解胎毒涼心火蟾
酥善祛臟腑毒氣從毛孔作臭牙出凡表實難出俱宜用
此四味如血虛出不勻色不潤者加當歸○紫草木香湯
紫草木香人參白朮茯苓甘草各四分糯米廿粒水煎溫
服治痘出不快大便泄利蓋紫草能利大便故用不香白
朮佐之或隱或見者加藿香○紫草木通湯紫草木通人
參茯苓糯米各四分甘草二分水煎溫服治痘出不快如
大便利者去紫草加木香○活血散赤芍歸尾紅花紫草
各五錢木香二錢血竭一錢爲末每二錢痘色淡白酒調
下熱極血焦不紅活紫草煎酒下○小活血散單白芍炒
爲末每一錢出快溫酒下痘痛溫水下倒靨紫草煎湯入
酒少許調服大能活血止痛除煩如兩腳膝攣加甘草即

有藥甘草湯也。○勻氣散即八味順氣散各五分甘草二分半木香一分半為末酒調服治氣滯痺出不快及肉腠厚密身痛。○陳氣散蒼朮白芷防風升麻黃芩白芍連翹歸毫各等分甘草節減半水煎服治氣實痰鬱發不出者。○連翹散連翹防風山柅甘草各等分水煎服治痘發熱不發。○萬金散防風二錢人參蟬退各一錢薄荷三葉水煎服或為末每二錢用開花蘿蔔煎湯調服取其欲發之義耳治痘已出未能勻透色不紅潤實者加升麻。鼠

粘湯治稠密以防陷伏

胡黃芪連翹各等分水煎溫服熱

退即止治痘出稠密身熱不退宜急服此藥以防青乾黑靨

調解散醫水硬而為邪侵

青皮陳皮桔梗枳殼當歸半夏川芎木通黃芩甘草紫蘇紫草各二分人參一分姜棗煎服未效加山查根治痘已發或為國冬所折榮枯不和或又為宿食所傷內氣壅遏以致水硬黑陷宜毒宣風芳大戟

山柅猪尾無價

宣毒膏硃砂乳香各一二兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢為末臘月八日取小活

積猪尾血一盞和勻以新竹筒一箇盛之用綿紙數重封
口繫於大糞坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各
一錢爲末水丸皂子大每一丸人參煎湯化下治毒盛症
出不快瘡黑倒靨神効○宜風散瘡癰陳皮炙甘草各五
錢牽牛四兩爲末幼者五分壯者一錢食前蜜湯調服治
痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹脹而喘二便赤澀面赤悶
亂大吐乃熱蓄於內當利小便不愈者宜服利後宜和脾
胃一單大戟丸又名百神丸紅芽大戟一兩用漿水煮熟
乾去骨晒乾復入原汁中煮汁盡焙乾爲末蒸餅丸粟米
大每二十丸研赤蘇湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚
寒戰緊口憂齒身黃紫腫○山拖仁湯山拖仁白蘚皮赤
芍升麻各二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水
煎溫服治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒盛黑色○猪尾膏龍
腦一錢爲末旋滴小法積猪尾血爲丸小豆大每一丸煩
燥紫草煎湯下陷伏溫酒下或用猪心血爲丸亦可治痘
出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒盛陷伏
者宜此速治惟虛寒者忌用○無價四尿散人尿用無疾
童子者猪猫犬尿用未破陽雄者先於重九日各置淨處

饒之飯食勿令雜食至旬日換盡腸中宿垢方收其屎陰
乾候臘月八日日出時火煨烟淨白色為度但表裏痘
發不快倒靨黑陷及一切惡瘡每用一字蜜水調服其
效如神若緊急黑陷甚者只單燒人屎亦好黑陷人
齒痛齒牙蟬退穿山兔血難尋人齒散人齒脫落者以砂
鍋因濟火煨通紅取出候
冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快既出倒
靨不斂寒熱脉遲或服藥過多溫酒下痘出色黑酒和
猪尾血下痘黑靨不出加赤小豆七粒薄荷泡酒下如
日前黑陷屬熱毒燈心煎湯下紫陷屬氣熱溫酒下血陷
屬血熱灰陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸煎
酒下如黑陷甚者用入齒五分羌活一錢穿山甲麝香各
少許為末每一錢麻黃薄荷煎湯調下一服便起凡入齒
不可過用一錢過則陽益出表陰盛裏寒必痘爛濡泄急
以四君子湯加芎歸救之四齒散人齒猪齒狗齒猪齒
各二錢半砂鑊因濟火煨通紅候冷為末每五分熱酒調
服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取效如神○單
蟬退湯蟬退此一箇或加甘草一錢半水煎服治痘疹已

痘

出不透腹痛或痘黑靨或蘊積熱毒及風毒充於皮膚癢
痒不止驚悸癩癩夜啼寒熱亦宜○用天散蟬退五分地
龍一兩為末每二錢研乳香湯下治痘瘡黑陷項強目直
腹脹喘急發搐連進二服而愈○獨聖散穿山甲取前足
及背上者炒為末每五分木香煎湯少入酒調下或入麝
少許尤妙如七日後黑陷紫草煎湯下紫陷溫酒下血陷
灰陷俱酒入麝香下白陷當歸煎酒下○虎血丸硃砂一
兩用麻黃升麻紫草荔枝壳四味同煮一日夜研細仍將
四味煎湯飛過晒乾天靈蓋三錢洗淨用麝香三錢炙令
黃色為末和勻臘月辰日取兔血或棗肉為丸菜豆大每
一丸溫酒化下治氣虛血熱痘瘡外黑赤而內白陷若神
效或只用藥末於發熱未出時用紫草升麻紫蘇葱白煎
湯調下一分表汗出痘亦稀但天靈蓋非燒化與至險不
可輕用痘家最忌穢汚凡臍帶童便大穢牛糞之類非經
煨燻聞之不可

牛蠶散牛黃丹目黃便閉而腫不乾

牛蒡子五錢姜蠶二錢半入紫草三錢煎服治痘早微熱
晚大熱目黃脇動身熱手冷發甚如驚惟虛寒者忌用○

痘

牛黃用牛黃一錢生大黃寒水石升麻各五錢粉霜硃砂各五分為末蜜丸黍米大每十九量兒加減人參或紫草薄荷煎湯下治痘出大便不通瘡中膿水不乾

雜 薤白湯薤白半盞豆豉一盞山梔十枚水煎薤白爛後量兒大小服之以去惡積治痘疹身熱下利黃赤膿血

○三黃熱艾湯黃芩黃連黃柏熟艾各等分水煎服或加糯米紫草甘草亦好治痘瘡正出似收未收下利黃臭膿血身熱大渴宜

此湯以解其毒身熱經日喜二參 二參湯柴胡麥門冬人參玄參甘草各等分

龍膽戕半水煎服熱退即止治痘壯熱經日不除胃冷吐瀉愛蘇葉胃受散糯米

六箇木瓜三分藿香蘇葉甘草各一分為末每一錢或五分粟米棗子煎湯下治痘出嘔吐泄瀉煩渴胃中虛冷

意寧醫十男子莫醫一婦人寧醫十婦人莫醫一小兒寧

醫十小兒莫醫一老兒

利

癰疽 雖屬外科用藥却同內傷

凡癰疽皆飲食七情房勞損傷脾腎肝所致間有外

邪相搏及小瘡瘍傳染亦皆因內有毒以召之也是以薛

立齋專用補中益氣湯以補後天腎氣凡以補先天中間

雜症氣用四君子血用四物湯痰用二陳湯替用錢龜丸

一同內科准初起內托內消和解補似傷寒故曰必通內

科與儒而後可

言知外科也

托邪毒而不陷分經絡以用方 腦背尻臀

黃連羌活 力厚

黃連消毒散黃連羌活各一錢黃芩黃柏

風歸尾連翹各四分黃芪蘇木陳皮澤瀉各二分人參耳

草各二分水煎服治足太陽經分癰疽發於腦項或背腫

勢外散熱毒嫩發麻木不痛宜先灸之或痛而發熱並宜

服之○內托羌活湯羌活黃柏各二錢黃芪一錢半防風

藁本扁犀各一錢連翹甘草蒼朮陳皮各五分肉桂三分

水二盞酒一盞煎至一盞熱服治足太陽經分癰疽發於

尻臀堅硬腫痛木

作兩尺脈緊無力

臂膊乳膺白芷升麻性涼

白芷升麻湯白芷一錢半

升麻、桂、槐各一錢，甘草、紅花各五分，黃芪、酒、芍各四錢，生
芍三錢，分二匙，水酒各半煎服。治手陽明經分，臂上生癰，
此得入風之變也。內托升麻湯，葛根、升麻、連翹各一錢，
半黃芪、當歸各半錢，各一錢，鼠粘子五分，肉桂三分，黃柏
二分，水二盞，酒一盞同煎服。治兩乳間出黑，十味中和湯
頭蒼，蒼頭陷下，作黑眼子，并乳癰初起亦宜。

疎邪於鬢耳側脇

石首蒲牛、莠子、羌活、獨活、防風、漏蘆、荆
芥、麥門冬、前胡、甘草各等分，水煎服。治

手足少陽經分發癰，及時
毒脈弦在半表半裏者。

八味逍遙散，降火於手足少陽

當歸、芍藥、茯苓、白朮、柴胡、甘草各一錢，牡丹、炒山梔各七
分，水煎服。治解胃血虛有熱生癰，或遍身癢痒，煩熱肢體
作痛，頭目昏重，或怔忡煩赤口燥咽乾，口舌生瘡，耳內作
痛，或發熱盜汗，食少嗜卧，或胃乳腹脹，小便不利，或手足
少陽火盛，內熱瞋熱，月經不調，寒熱往來，或脇乳腫痛，
耳下結核等症。加頭目不清，加川芎五分，蔓荊子七分，不

陰腿內膝足甚，柴附子湯入酒

內托升麻湯，黃芪二錢，柴
胡一錢，羌活五分，連翹一

錢半土瓜根酒洗一錢歸尾七分半肉桂三分半生地黄柏
各二分水二盞酒一盞煎熱服治足太陰厥陰經分癰生
腿內近膝股或離或附骨疽初起腫痛勢大○附子六物
湯附子防已肉桂各一錢茯苓白米各七分甘草二分半
姜煎服治足太陰經流注四氣骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時麻腫兼治五痺少陰腿

外臙廕內托黃芪酒煎湯

內托酒煎湯黃芪歸尾各二錢
柴胡一錢半連翹肉桂大力子

白芷各一錢升麻七分黃柏甘草各五分水酒各半煎服
治足少陰經分癰生腿外側或因寒濕得附骨疽或微侵
足陽明經分堅硬腫痛不能行○瀉心護心主痛并瀉心湯大黃一錢黃
連黃芩山梔蒲黃澤

蘭連翹黃芩各五分量虛實水煎服治癰疽瘡毒腫盛發
藥煩渴脉洪實而數○護心散菴豆粉四錢乳香一錢為
末甘草煎湯調時時細呷瘡已沈晦加肉桂二錢當歸一
錢煎湯調服治諸發背疔腫曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔
吐喘嗽泄瀉而痛喉舌生瘡各日心氣絕初起宜服此藥
最能反出毒氣不致內陷發後亦可間服此藥加山梔杞

皮末二錢又。可外敷。止瀉。瀉肝清肝肝主瘡瘍。龍膽瀉肝湯。龍膽草等。

生地當歸尾山桅黃芩甘草各五分水煎治肝經濕熱或
囊癰便毒下疳懸癰腫癰作痛小便澀滯或婦人陰磨痒
痛或男子陰挺腫脹或出膿水。○清肝湯。川芎當歸各一
錢白芍一錢半柴胡八分山桅炒牡丹皮各四分水煎服。
治肝經血虛而有怒火。○清肝解鬱湯。當歸白朮各一錢
半人參柴胡牡丹皮陳皮川芎各八分茯苓貝母芍藥熟地
地山桅各一錢甘草五分水煎服治癰疽因肝經血虛風
熱或肝經鬱火傷血乳內結核或為腫潰不愈凡肝膽經
氣血不和之症並皆治之。○清肝益榮湯。白朮二錢熟地
一錢半當歸山桅木瓜茯苓各一錢龍膽草八分川芎芍
藥柴胡各七分甘草五分水煎服治肝膽小腸經風熱血
燥筋攣結核或耳項胃乳脇肋作痛或作瘰癧子并一切肝
火血症。○桅子清肝湯。山桅柴胡牡丹皮各一錢茯苓川
芎芍藥當歸牛蒡子各七分甘草五分水煎服治二焦及
足少陽經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或頸項
胃乳等處作痛或寒熱胸甚自汗口苦或目唇搖動等症。

如作痛或寒熱加酒炒茶連煎連太陽或頭痛加羌活柴胡清肝湯柴胡山梔各一錢半黃芩人參川芎各一錢連翹桔梗各八分甘草五分水煎服治鬚疽及肝膽三焦用熱怒火以致頸項耳前後或胃乳脇肋作痛或胸熱不食寒熱往來嘔吐泄瀉等症惟未發為氣血實與當奪泄以瀉其壅盛

內疎清熱消毒敗毒解毒打膿追膿潰膿善用湯連翹二

錢大黃一錢半黃連黃芩山梔薄荷木香檳榔芍藥當歸桔梗甘草各一錢水煎服量虛實用之治熱毒在臟癰疽腫硬發熱嘔吐大便秘結脈洪而實屬純陽症一方去木槿加金銀花牡丹皮○清熱消毒飲金銀花二錢芍藥川芎生地各一錢半當歸黃連山梔連翹甘草各一錢水煎服治癰疽陽症腫痛發寒熱作渴等症○人參敗毒散治一切癰疽喉痛發寒熱或拘急頭痛屬表症宜用○黃連解毒湯治癰疽喉痛煩燥飲冷脈洪數或狂言等症一方見傷寒門○打膿散木鱉子虛者七箇實者九箇金銀花黃芩黃連黃柏歸尾各一錢大黃一兩甘草節穿山甲各

七分芒硝三錢水煎五更服大便見膿小便見血為効治諸癰腫不放膿出○追膿化毒散穿山甲當歸木黃各三錢玄明粉姜蠶乳香沒藥各一錢半白芷一錢水煎服并查治一切癰疽瘰癧便毒瘰癧火胃緊初起下以平之○潰膿散白芷上中二錢下一錢六分陰一錢四分穿山甲上三片中二片下陰一片半乳香上一錢四分中九分下陰八分姜蠶上一錢中五分下一錢四分陰一錢二分甘草節上一錢六分中一錢四分下一錢三分陰一錢六分為末先以當歸煎酒洗過如瘡在頭心上者服四錢四分心膈中者服三錢七分腿足下者服三錢半肚腹內陰者服四錢半俱用水酒各一盞煎調煎未通口盡服如不足好酒和之取利為度治癰疽發背疔瘡瘰癧對口乳癰男婦便毒魚口惟已發為榮衛薄歟當補托以接其虛怯已成未成皆効

托裏清中溫中和中建中抑青益黃益氣相當

托裏散人參黃芪各

二錢白朮陳皮當歸熟地茯苓芍藥各一錢半甘草一錢水煎服治癰疽氣血虛不能起發腐潰收斂或惡寒發熱

肌肉不生宜此補托如癰腫熱毒加黃連浸腫氣虛倍參
朮表邪加羌活川芎表虛倍參芪內熱飲冷便秘去參芪
歸朮加大黃內虛飲熱便秘倍參芪歸朮寒熱飲冷嘔泄
肝熱去參芪加柴胡炒山梔不作膿膿不潰氣虛也加參
朮桂腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥肉赤不斂血虛有
熱加熟地牡丹皮肉黑不斂陽氣虛寒也加參芪肉桂白
斂肉白不斂陽氣虛也膿多不斂氣血虛也俱倍參芪歸
朮漫腫不痛肉死不潰脾虛甚也加參朮姜附膿多帶赤
血虛也倍參朮歸地忿怒喘熱出血肝火血虛也加牡丹
山梔熟地面青脇脹出血肝虛不能藏也加山藥山茱萸
五味子食少體倦出血脾虛不能攝也倍參芪歸地鬱結
少寐出血加遠志酸棗仁茯神龍眼肉欬嘔作嘔或外搽
內服寒涼或痛甚或感外邪穢氣作嘔胃虛也加藿香參
朮少食腹痛腸鳴冷瀉脾虛寒也加炮姜木香膿多作渴
氣血虛也加熟地五味子麥門冬並痛瀉泄精內敗也加
山藥山茱萸澤瀉勞役弱赤氣下陷也加升麻柴胡日晡
頭痛眩暈陰血虛也加熟地身熱惡衣欲投水中脈沉微
細氣脫發躁也加姜附肉桂補熱多痰脾血虛也倍歸地

參朮善思體痛不寐盜汗脾血虛也加茯神酸棗仁寢寐
汗出腎氣虛也加五味子飲食汗出胃氣虛也加參朮五
味子勝覺飽而盜汗宿食也加參朮半夏婦人勞怒夜熱
或譫或適經行熱在血分也加柴胡生地牡丹皮○托裏
消毒散人參黃芪當歸芍藥白朮茯苓陳皮各一錢連翹
白芷金銀花各七分甘草五分水煎服下方去連翹加川
芎卑刺乳香沒藥治癰疽腫痛俱慢色不甚赤元氣虛弱
或行攻伐不能潰散者宜用之未成者消已成者潰又去
腐生新之良劑也加戒同煎但虛弱及已潰者去翹並金
銀花三味消毒之藥○托裏清中湯人參白朮茯苓陳皮
半夏桔梗各一錢甘草五分姜棗煎服治癰疽脾胃虛弱
痰氣不消飲食少思等症○托裏溫中湯附子四錢乾姜
羌活各三錢益智仁丁香沉香木香茴香陳皮各一錢甘
草二錢姜煎服治癰疽腸氣虛寒腸鳴切痛大便溏泄飽
逆昏憒此寒變內陷緩不可救○托裏和中湯人參白朮
茯苓陳皮半夏炮姜各一錢木香甘草各五分姜棗煎服
治癰疽中氣虛弱飲食少思瘡不消散或不腫痛或潰而
不斂等症○托裏建中湯人參白朮茯苓各二錢半夏炮

姜各一錢甘草五分姜棗煎服治癰疽元氣素虛或因寒
涼傷脾損胃飲食少思或作嘔泄瀉等症急服此藥以健
中氣○托裏抑青湯人參白朮茯苓陳皮半夏各一錢芍
藥柴胡各五分甘草三分姜棗煎服治癰疽脾胃虛弱肝
木所侮以致飲食少思或胃脘不利等症○托裏益黃湯
人參白朮半夏陳皮川芎香附山梔瘡木各一錢甘草五
分姜棗煎服治癰疽脾胃虛寒水侮土以致飲食少思或
嘔吐泄瀉等症兼治癰疽六腑所傷中氣虛弱食少等症
○托裏益氣湯白朮二錢人參茯苓貝母陳皮香附芍藥
當歸熟地各一錢桔梗甘草各五分水煎服治癰腫硬肉
色不變或哺熱或潰而不斂并一切血氣內症如口乾加
五味子麥門冬寒熱往來加柴胡地骨皮膿清加黃芪膿
多加川芎肌肉遲生加白欬肉桂且夫腦疽疔活最靈
酒柏連翹防風羌活甘草山梔子各一錢獨活藁朮各七
分澤瀉五分水浸良久入酒一匙煎熱服日二次三日盡
六服却將藥清汁調下木香檳榔末各二錢因膏梁熱鬱者宜貧窮寒濕者少用頭瘡酒歸立化

酒歸飲酒當歸白朮各一錢半酒芍酒芍川芎陳皮各五分
分酒天麻蒼朮蒼耳各七分半酒甘草黃柏各四分防風
三分水煎日四五服服後蘊睡片時

瘰癧未破宜內消調經通經散堅軟硬

而必効立應斑鷄其霸乎

外瘰調經湯升麻八分葛根草
龍膽黃連桔梗連翹酒芍酒柏

莪朮三錢半草各五分歸尾芍藥各三分生黃芩四分稍
虛加夏枯草有痰加天花粉知母各五分少陽加柴胡四
分先用水浸半日煎熱服再用大料為末蜜丸棗豆大每
百丸服藥時足高去枕仰臥緩緩以前湯送下治瘰癧瘻
頸或至頸車屬足陽明瘡深遠隱曲肉底屬足少陰乃戊
胃傳於癸腎俱作塊堅硬大小不一並皆治之○柴胡通
經湯柴胡連翹歸尾半草黃芩桑梔子三錢桔梗各二分
黃連五分紅花少許水煎熱服忌苦藥泄大便治少陽部
分項側有核堅而不潰各日馬刀二湯元氣無虧者可服
○海藻散堅丸海藻昆布龍膽草蛤粉通草貝母桔梗真
松蘿各三錢麥蘆四錢半夏二錢為末酒調服或蜜丸棗
豆大每卅丸臨卧蘊頭白湯下并含化燕之忌并草魚雞

猪肉五辛生冷治瘰癧馬刀堅硬形瘦潮熱不食兼治一
切瘰氣神效。○散搜臭子丸。臭子一盞去粗皮黃心。女參
連翹各一兩水五盞煮乾。揀取者食後細嚥津液下硬者
蜜丸如彈每夜含化一丸半月即効未破者破已破者全
按易落不問遠年近日腫硬疼痛皆宜如體盛硬甚者皂
子用礪砂醋煮令酥瘰癧少少服瘰癧多多服。○必効散。礪砂
一錢半輕粉一錢麝香五分巴豆五箇橫切一箇瑛瑛四
十枚為末用鷄子二箇取清調勻復入壳內濕紙封固蒸
熟取出晒為末虛者五分實者一錢五更姜酒調服如小
腹作痛瀉如粉片血子是毒出也若覺小便澀痛用益元
散一服或毒從大便出尤快未下三日後再進一服以病
根去盡為度治果患瘰癧宜此切之。○立應散。連翹赤芍
川芎當歸甘草滑石各五錢黃芩斑蝥各三錢土蜂房蜜
水洗飯上蒸晒乾白牽牛各二錢半川烏尖七箇為末每
一錢濃煎木通湯調服毒從小便出如粉片血塊是
也未効再服繼以宣熱丹解其風熱且瑛瑛性毒濟以烏
尖或衝上麻悶者嚼葱白茶清下以解之如小便澀用燈
心煎湯調五苓散患瘰癧用好膏藥貼若宜導瘰癧惡毒去

黃芩、瑤雞丸、瑤雞一兩、薄荷四兩、為末、以鷄子清和丸、
募豆大、空心及半空心、臨卧茶清下、丁丸、每日加一丸、加
至五丸、每日減一丸、減至一丸、又每日加一丸、加至五丸、
後每日仍服五丸、以臍下痛小便取不惡物為效、如小便
秘、喫葱茶、少許、或用身鷄子一箇、頂上開一竅、攪勻、以瑤
雞一箇、入內、以紙封之、蒸熟、去瑤雞、吃彈、一日一箇、煎生
料五積散、送下、不過四五枚、已破者、
生肌未破者消散、治瘰癧多年不瘥、瘰癧已破、兼外治、白
蛇白蠶宣熱、補中、而銀花、蠶繭、貓蝠可敷也、
白蛇散、白花蛇、二兩、青皮

黑丑各五錢、生犀角五分、為末、每一錢入膩粉五分、研勻、
五更糯米飲調下、已時利下惡物、十日後再進、一服忌發
風、壅熱物、如瘡已成者、一月可効、治九漏、瘰癧、增寒、發熱、
或痛或不痛、利後用海藻石決明、羌活、瞿麥各等分、為末、
米飲調下、二錢、日三服、下盡清水後、調補、以除病根、○白
蠶丸、海藻、姜蠶各等分、為末、取白梅肉湯泡、搗丸、梧子大、
每六七十丸、臨卧米飲下、毒當從大便泄去、忌豆、心、鷄、羊、
酒、麪、日五六服、治癰生於顙、項上交、接名蛇盤癰、宜早治、

之或單用海藻一片浸酒服亦好。○宣熱丹薄荷皂角連翹何首烏蔓荊子三稜荆芥各一兩爲末用熱醋浸淡豆豉二兩半搗膏和丸梧子大每卅丸熱水下日一服解癰瘰癧風熱之毒自小便宜毒後及病雖愈宜常服之。○補中勝毒餅黃芪一錢人參三分甘草五分已上三味補氣調中爲主當歸生地熟地白芍各三分已上四味和血生血藥也惟芍藥兼能益氣之聖陳皮三分順氣升麻五分足陽明引藥柴胡五分足少陽引藥連翹一錢散血結氣聚癰藥不可缺也防風五分散結去上部風邪已上共爲末湯浸蒸餅調劑捏作餅子晒乾搗如米粒大每三錢白湯下治瘰癧馬刀拔癰在手足少陽陽明部分受心脾之邪而作如足陽明部瘰癧多倍升麻加漏蘆一錢乾葛五分手足太陽項脊背腰強者加羌活一錢獨活五分腫甚加鼠粘子三分堅硬加昆布硬甚加三稜莪朮各二分寒月身涼或有腹痛加肉桂二分暑月身熱或有煩悶加酒黃連黃柏各三分腸胃有瘀血加牡丹皮三分少食加麥芽神麴各二分便秘加酒大黃或麻仁桃仁秦艽陰寒必結去諸苦藥加附子一錢姜煎冷服如瘰癧陽明部分思柴胡

鼠乳子屬少陽部分為馬力拔癭忌獨活漏蘆升麻乾葛
加瞿麥三分○銀右散硃砂雄黃蛇含石礞石各一錢半
銀右石乳香沒藥各一錢七分明礬一錢信石白丁香各
六分麝香三分牛黃一分巴豆二錢半為末嚙口涎調勻
用本身男左女右手塗瘡上外用新筆蘸藥圖四圍藥黑
中間水粉膏貼之○上藥一七二七其核自落後用生肌散
○蠶繭散蠶繭三箇白木信石各一錢俱火煨為末糝爛
肉上二三日其核即下○貓頭散貓頭骨一箇蝙蝠一箇二
味俱微黑豆上同燒其骨化碎為通用貓頭要減加
末乾搗治瘰癧多生不愈神效
頭骨一箇酥炙蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹內瓦上炙
焦南星白礬各一兩為末用黃蠟溶化和在菜豆大每
丸臨臥米飲下如風熱實者加防風黃芩山柝蟬退川芎
連翹桔梗各五錢虛者加夏枯草二兩虛癆骨蒸加玄參
一兩胡黃連五錢汗多加牡蠣三錢有痰加麥門冬一兩
血虛加歸芍生地氣虛加參朮各一兩虛重加雄黃痛甚
加乳沒各二錢堅硬加海藻四錢成漏加穿山甲一兩便
瘰癧用蜜為丸空心及夜卧含化三丸尤妙治瘰癧馬力不

問遠年近日已破未破
用此加裁得宜皆效
吞貼夏枯益虛者
夏枯草六兩水

二鍾煎至七分食遠服
虛甚者煎成膏多服
益善并塗患

處兼服十全大補湯
加香附貝母遠志
治瘰癧馬力已潰

未潰或日久成漏生血
散結退寒熱之聖藥也
惟實者宜

以行散之藥佐之
治瘰癧潰爛久不愈者
用鼠骨亂髮

如鷄子大以三年臘月
猪脂煎令骨髮俱
出痰核潤便含化

消半全養半酒調服
與史鼠子從瘡口出

丹或海帶丸以內消融
含化丹姜蠶大黃青黛膽星各等

核○海帶丸海帶青皮貝母陳皮各等分
甚者加昆布為

末蜜丸彈子大每一丸
食後含化治痰核瘰癧氣經久不消

嬰疔開結紙草散或南星膏以外敷瀉
神効開結散沈香

皮四兩珍珠四十九粒
砂鍋固濟火煨猪酥肉子生指頭

下痰嗽系一枚如棗大微
扁色紅取四十九箇瓦上焙乾

共為末每二錢用時
冷酒調徐徐嚥下輕者三五服見効

重者一料全愈忌酸鹹
油膩滯氣之物治男婦下疳瘰疾

不問遠年近日皆效。○餅藥散海藻一兩散結黃柏二兩
降火為末每用少許置掌中時時舂之津液送下如消三
分之二即止後服。○單方太蜈蚣搗酒頻服或海藻浸酒
久服癰氣瘰癧皆效。○南星膏鮮南星一箇細研調粘酒
好醋三五點和膏或醋調乾南星末亦好先將針刺腫處
金氣透却以前膏攤紙上量形大小貼之覺痒則頻貼至
效治肌膚頭面頸項生癰癩大如拳小如粟或軟或硬或
不疼不痛癰疽亦治熱者加黃柏虛者加川烏木少許

乳核一醉可消正貝中漏蘆可加

一醉膏瓜蒌一箇去皮
研爛甘草五錢沒藥二

錢半用紅酒三碗煎至一碗半分兩次溫服重者再進一
服以瘰癧為度或加當歸白芷乳香亦妙治癰疽發背乳癰
初起神效如要宣毒加皂刺一分。○正貝散白芷貝母
各等分為末每一錢酒調頻服治有孕乳結核各內吹之
有兒外吹效宜此頻服不然膿出若無乳行者加漏蘆煎
酒調服外用起醇生變如蜂巢發上上有青色無妨焙乾
為末并水調敷如乾以水時潤之。○乳癰青頻服瓜蒌外
甚效加白芷貝母乳香沒藥少許

參芪難舍

單青皮湯青皮四錢水煎日二服治婦人久積

炒為末入麝香少許每二錢酒調服初發赤腫痛不可忍

一服即散已潰及外效亦如○瓜蔓散瓜蔓仁須毒青

皮陳肝各一錢石羔二錢清胃甘草節行痰沒藥止痛歸

屠破血皂刺金銀花各五分青橘葉取汁二已鮮毒水酒

各半煎空心服治乳癰未潰者即散如已潰者去石羔沒

藥皂刺金銀花用當歸身加人參黃芪川芎白芍煎服○

單方用蒲公英英金銀花等分水煎濃汁入酒少許服之即

散○治乳勞癰爛見心者用貓兒腹下毛煨存性為末乾

糝或入輕粉少消肺癰腫以南星補肺補脾真要訣消腫

許清油調搽

星一錢知母貝母生地阿膠川芎桑白皮白芨白芷甘草

各五分射干燕梗天門冬薄荷杏仁半夏紫蘇防風各七

分半生薑七片烏梅一箇水煎服治肺癰有膿腥氣上衝

嘔吐破嗽○參芪補肺湯人參黃芪白朮茯苓陳皮當歸

山茱萸山藥五味子麥門冬甘草各五分熟地一錢半杜

丹皮一錢姜煎服治肺癰腎水不足虛火上炎咳吐膿血

發熱作渴，小便不調。○參朮補脾湯：人參、白朮各二錢，黃
 芪二錢半，茯苓、陳皮、當歸各一錢，升麻三分，麥門七分，桔
 梗六分，五味子四分，甘草五分。姜煎服。治肺癰、脾氣虛弱、
 咳吐膿涎、中滿不食、凡肺癰見膿血，久不愈，必兼服此藥，
 以補脾生肺。○止肺癰血用紫苑、白欬、白芨、非苟且。
 此紫苑散，此紫苑知。

母貝母各一錢半，人參、桔梗、茯苓各一錢，阿膠、甘草各五
 分，五味子十粒。姜煎服。治虛勞咳嗽，見膿血，肺癰變癰。○
 單白欬散：同檉榔皮煎湯飲之，能收斂瘡口。○單白芨散
 為末，每一錢，鹽煎糯米飲調服。治久嗽成癆，咯血紅痰。

內固清心散 癰發胃前。內固清心散：辰砂、茯苓、人參、白朮、
 葛根、黃耆、豆朴、硝石、甘草、膠、麝、皂角。

各等分，為末。每一錢，蜜湯調服。治惡瘡熱甚，癰痛作渴，煩
 燥。以此解毒神効。○清心散：遠志、赤茯苓、赤芍、生地、麥門、

冬、知母、甘草各等分。姜煎服。治癰有熱症，如小便閉，加
 燈心木通。○清心丸：黃連一兩，茯苓、神赤、茯苓各五錢，為末。

蜜丸。梧子大，每百丸，米飲送下。治諸痛痒癰瘍，皆屬心火。此藥土之。神効瓜蒌湯：癰生脇下。

瓜蒌一箇當歸甘草各五錢沒藥乳香各一錢水酒各半煎服治乳癰腸癰一切癰疽初起者消已成者潰及潰後餘毒者勿皆宜
大射干能升胃三仁牡丹清芳
射干山桅

赤茯苓升麻各一錢赤芍一錢半白朮五分水煎入地黃汁一合蜜少許調服治胃脘壅熱成癰腐爛成膿身皮甲錯咬嗽膿血如熱毒盛加磨犀角汁以助升麻咽痛便秘加馬牙硝馬勃○三仁湯薏苡仁二錢半冬瓜仁二錢桃仁牡丹皮各一錢半水煎溫服治腸癰腸中疔痛煩毒不安或脹滿不食溺澀婦人產後壅熱多有此病縱非是癰症疑似之間便可服之○牡丹散牡丹皮人參天麻白茯苓黃芪薏苡仁桃仁白芷當歸川芎各一錢官桂甘草各五分木香三分水煎服治腸癰
大黃湯本利腸敗醬梅豆

多寡大黃湯大黃朴硝各一錢牡丹皮瓜蒌仁桃仁各二錢水煎服治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或微赤腫小便如淋汗出憎寒其脉遲緊膿未成者宜急服之○敗醬散薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子五分水煎

空心溫服以小便利為度治腸癰肛數身無熱腹濡冷症

○舊臣湯烏梅一箇黑豆百粒煮以仁二合水煎入阿膠

生清黃各一錢再煎服治腸癰

心熱症及肺癰咳唾膿血不止便毒兩解而敗瘰立消

湯辣桂大黃白芍澤瀉牽牛桃仁各一錢乾姜五分甘草

二分半水煎溫服治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯

腫結瘰癧國老而元氣可掉國老膏粉草帶節一兩用山

火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度用酒三盞煎至

八分空心服并查三日一服治懸癰不拘腫潰兩服即愈

痔初連魏連歸蘇葛秦羌止痛神連魏散黃連阿魏山查

角各等分為末以少許置掌中時時舐之津液嚥下如三

分消二即止後服治食積痔○連歸丸全當歸酒黃連各

四兩防風枳壳各二兩為末用前浸黃連酒打糊丸梧子

大每六七十九米飲下忌羊魚雞鵝煎炒熱物治痔漏及

脫肛便血○加味連壳丸黃連一兩枳壳厚朴各五錢當

歸四錢木香黃柏各二錢荆芥一錢蟬皮一箇為末糊丸

七

梧子大每卅丸溫水下治濕熱內甚飽食腸癖發為諸痔
 久而成瘻○加味香蘇散陳皮枳壳川芎槐花各五分攪
 柳木香桃仁蘇莖香附甘草各二分半姜棗煎服治氣痔
 ○乾薑湯乾薑枳壳半夏茯苓生地杏仁各五分黃芩甘
 草各二分半里豆百粒姜三片白梅一箇水煎服治遇飲
 酒發動痔瘡腫痛流血○秦羌湯秦羌羌活各一錢二分
 黃芪一錢防風七分升麻麻黃柴胡炙甘草各五分藁本
 三分細辛紅花各少許水煎服忌風處大小便治痔漏成
 塊下垂不任○止痛丸羌活一兩郁李仁一兩半大黃八
 錢橫柳木香桂心川芎各五錢為末蜜丸梧子大每卅丸
 空心白湯下治痔瘡痛甚便燥者宜此微利之古云積氣
 生於脾臟傍大腸疼痛陣難當但令消滯瀉三焦火莫慢多
 方立紀綱○三神丸枳壳皂角煨五倍子炒各等分為末
 蜜丸梧子大每二十丸溫水下治無酒色但飽食久坐
 成痔初起痔久槐角槐膳地黃蠟皮釣腸妙槐角丸槐角
 經久皆効○痔久槐角槐膳地黃蠟皮釣腸妙槐角丸槐角
 灸防風當歸枳壳各八兩為末酒糊丸梧子大每卅丸空
 心米飲下治痔漏脫肛五種腸風下血等症○加味槐角

九棍角生地各二兩以生血氣當歸黃芪各一兩阿膠
川芎各五錢以補虛黃連瀉心火條芩束太腸枳壳寬大
腸秦朮去太腸風防風為血症上使連翹為血症中使又
能散經絡中火邪地榆為血症下使又能求血升用各一
兩升散火邪又與白芷五錢引諸藥入大腸經絡蓋痔乃
經絡病也共為末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十丸漸至
七八十丸溫酒下治痔漏通用及腸風下血○槐脂十
月上巳日揀肥實槐子用瓦盆如法固濟埋背陰墻下約
二三次深頭先取黑牛膽五六箇臘月八日取前槐子裝
在膽內高懸陰乾至次年清明日取出磁器收貯每空心
白湯下一日服三粒二日二粒漸加至十五粒止以後一
日減一粒週而復始不問遠年近日痔瘡服之如神久服
黑髮固齒○加味地黃丸熟地黃各一兩半槐花黃柏
杜仲白芷各一兩山茱萸獨活山藥各八錢牡丹皮茯苓
澤瀉各六錢白附子二錢蜜丸梧子大每五十丸空心米
飲下五痔瘡陰必用之○蠟皮丸槐花艾葉炒黃柏壳地
榆當歸川芎黃芪白芍枳殼貫衆各五錢蠟皮一兩髮灰
三錢猪蹄甲十枚炙焦白芷一錢醋炙為末蜜丸梧子大

年五十者米飲下流諸痔出血裏急疼痛欲成漏者
腸九瓜蒌蛻皮各二箇胡桃肉十五兩俱燒存性雞冠花
五兩青礬煨白礬煨附子生各一兩白附子天南星枳壳
半夏訶子各二兩為末醋糊丸梧子大每廿九空心溫酒
下治諸痔久漏脫肛腫痛或生瘡時
有膿血及腸風下血虛寒經久不愈漏無輕利水而豚胃

芎歸急補虛

牽牛酒黑牽牛末一分入猪腰子內以線扎
葉葉包慢火煨熟空心細嚼溫酒送下通行

漏瘡中惡水自天腸出○豚胃丸蛻皮七錢升并皮黃連
各一兩槐花二兩羌活六錢入猪肚內縫定煮爛去藥食
肚加破再服以患處軟方止或同藥為丸服亦可痔漏皆
効○芎歸丸川芎當歸黃芪神曲地榆槐花各五錢阿膠
荆芥木賊髮灰各一錢為末蜜丸梧
子大米飲下五十丸治痔下血不止漏貴內生肌而黃蠟

黑玉自充竅

內生肌丸枯礬鹿角芝麻各一兩為末蜜丸
梧子大溫酒下卅九竅塞後去鹿角加象牙

一兩黃蠟為丸常服斷根○加味礬礬丸象牙五錢露蜂
房姜鐵蛇退血竭木香各三錢乳香二錢白礬一兩為末

黃蠟四兩爲丸。梧子大溫酒下廿丸。治新久諸漏。○黑玉
丹。蝟皮、牛角、臍各八兩，猪蹄甲百枚，雷丸、芝麻各二兩，槐
角三兩，頭髮、敗蒜各四兩，苦練根二兩半，俱入碓內燒存
性，取出入乳香一兩，麝香四錢爲末，酒糊丸。梧子大先嚼
胡桃一枚，溫酒下十五丸。日二服，甚效。三服忌別藥。治男
婦痔漏，腸風疼痛，或穀道虫痒不可忍。○薰漏瘡方。艾葉
五倍子、白膠香、苦練根等分，布燒香法，置長桶內，坐薰瘡，
處○洗漏瘡方。露蜂房白芷，或大腹皮、苦參煎湯薰洗，俟
水出盡拭乾，取向東石榴根皮爲末，乾糝以殺淫虫，少須
傳藥。○齒髮散。人齒頭髮、鷄肝、脰各等分，俱燒存性，入麝
香、輕粉少許，以末乾糝，乾者麻油調，搽治漏瘡惡瘡，生肌
裏欲乾者用之。○蜂房散。露蜂房灸黃，二分，穿山甲、龍骨
各一分，麝香少許，爲末，臘月猪脂調，傳濕則乾糝治之。久年
漏瘡，或暫差復發，或移於別處。○取漏虫法。用活黃鱈一
條，擲在地上，就其盤曲處，以竹針五七枚，釘穿，以香油塗
之，覆瘡上，布帛繫定，良久覺瘡痛不可忍，取鱈入水中，覺
蠕動有如線之虫，未盡再覆，如是者五六易，後用乾艾煎
湯入白礬三錢洗淨，以黃連、檳榔等分爲末，敷之，月餘方

精

取汁敷痔上痛止腫消。○古能水膏熊膽一分半冰片半
分爲末用白鷄膽三枚取汁或蠅牛田螺井水
可調勻入罐內勿令泄氣照臥以手指搽痔上
銅綠石精蘆腦以津調栢蛤散黃柏以磁鋒割朱同蛤粉
末等分糝上即愈蓋黃柏去熱蛤
粉燥濕故也治下痔濕瘡○銅綠散五倍子五錢白礬一
錢乳香五分輕粉一字銅綠少許爲末洗淨糝之治男婦
陰部濕淹瘡○蘆腦散蘆甘石一兩半黃連八錢同入砂
鍋煮一宿去黃連取甘石晒乾入片腦五分爲末乾糝治
下痔瘡或湯泡少許洗一切眼疾○津調散黃連款冬花
等分爲末先以地骨皮蛇床子煎湯洗拭然後以津液調
敷治妬精瘡臭
爛膿汁淋瀝陰蝕鳳衣旱螺截痔鴛管兼敷俵鳳凰衣散
煨黃連各等分輕粉片腦各少許爲末乾糝或鴨子清調
治下痔瘡腫痛神效○旱螺散白田螺壳煨過入腦麝輕
粉各少許爲末香油調搽下痔瘡上即愈○截痔散密陀
僧白礬白芨黃丹各一錢黃連五分輕粉一分腦麝各半

分爲示乾糝或絛入膏口以膏貼之治年深痔瘻瘡大效

○驚管散黃連太黃各一錢驚管石赤石脂各五分雄黃

一分片腦半分爲末津液調敷治病瘡後犯房玉莖皮破

腫痛○洗下痔瘡藥黃連黃柏當歸白芷獨活防風朴硝

荆芥各等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇鹽一匙煎溫

湯日洗五七次洗後用木香檳榔黃連銅青輕粉枯礬螺

蛸各等分麝香少許爲末至夜敷上

補心疏鯉膿滯陰戶如淋 補小腸人參 茯苓前胡半

夏川芎各三分陳皮枳殼紫蘇桔梗乾姜甘草各五錢當

歸白芍各一兩熟地一兩半每四錢姜朮煎服治婦人陰

戶生瘡或痛或痒如虫行狀膿汁淋漓陰蝕已盡治之當

補心養胃如濕熱有虫者去姜朮參朮加苦參北艾桃仁

吳黃水炒黃連○古疏鯉丸大鯉魚一箇去頭皮入硫黃

一兩黃泥固濟火煨烟盡爲末米糊丸梧子大每廿丸溫

酒下如下疽生虫所下如柿汁臭穢

及心中疔痛悶絕虛煩甚者不治

藿香養胃瘡生子宮

可笑 藿香養胃湯藿香薏苡仁神麝烏藥砂仁半夏桑葉

白米人參各五分萆澄茄甘草各三分半姜棗煎服

治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

止囊痒 牡礬 硫磺 頻擦

牡礬丹牡蠣黃丹各二兩

枯礬四兩為末遇夜睡時用手捏藥於痒處擦之不一時

又搽三四次後自然平復治陰囊兩傍生瘡或陰濕水出

其痒甚苦夜則搔之無足後必自痛又兩腋及脚心汗濕

無可奈何者亦宜○硫磺散橫櫛二箇破開以黃丹三錢

合在內溫紙包煨蛇床子硫黃各四錢全蝎六箇輕粉青

黛各五分麝香少許各為末和勻每用少許清油調抹兩

掌擦熱拍囊一頃次擦兩腿上

治陰囊上及兩腿上風濕瘡痒**利囊** 龍膽慢炒勿燥

湯龍膽草炒黑柴胡木通甘草節當歸金銀花皂刺赤芍

防風黃連吳茱萸水炒各等分水煎服一服腫痛止後加川

芎藭茯苓治陰囊腫**附骨** 寒鬱漏蘆敢以汗下

痛溺澀寒熱作渴**附骨** 寒鬱漏蘆敢以汗下

麻黃枳實升麻芍藥甘草朴硝各五分大黃一錢水煎熱

服治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚眼五發癰疽目翳

吹妳初起如傷寒

表裏症具者宜服**附疽** 濕熱蒼柏加以青甘

蒼術黃柏各

三錢青皮一錢半甘草五分虛者加牛膝一錢夏加黃芩
八分冬加桂枝五分痛甚無汗加麻黃二分水煎入姜汁
少許調服治環跳穴痛不日

大苦參吐人面於膝蓋

大苦參九苦參四兩防風荆芥白芷

川烏赤芍何首烏獨活山柅川芎牙皂蔓荊子茯苓山藥
茯苓黃芪羌活白附子各一兩草烏三錢為末麴糊丸梧
子大每三五十丸空心溫酒茶清下治人面瘡及腫瘡

白膠香敷傷手於脛尖

白膠香散

白膠香赤石脂枯礬各五錢黃丹乳香沒藥輕粉各二錢
為末乾糝濕則油調敷治諸疥侵蝕日久不愈下注腫瘡
疼痛內外踝生瘡謝傳傷手瘡方猪屎火煨攪柳各五
錢片腦五分花椒龍骨各一分有膿水加輕粉一錢為末
乾糝濕者麻油調搽治脚上生瘡腫痛

外腫龍骨馬齒而

蜜土兼除濕熱

龍骨馬齒龍骨乳香沒藥陀僧各二錢海鱧

紙雙重以針掃亂孔清油調藥夾內縛貼瘡上臘日一番
兩面貼之馬齒膏馬齒煎汁一盞渣去查入黃蠟五

丙慢火熬成膏，塗之治卅六種風瘡，多年惡瘡及膿瘡濕癰，白朮杖瘡，旋加梳垢可封疔腫。○**蜜土膏**：經年蜜電土燥濕，或只用蜜心土、黃丹、輕粉、黃柏散熱，乳香沒藥散瘀，赤石脂生肌，各等分，爲末，清油調成膏，用傘紙夾住貼之，以綃縛定，縱痒不可動，直待膿蒼結痂，去之未愈再貼，先以茶清洗過方貼。

肉膿油艾磐紙而

黃蠟能補潰瘡

桐油膏、桐油二兩，宜水毒百草霜生肌，止血，髮灰補陰，公骨加鹿角

灰、乳香各三錢，同熬成膏，攤油紙上貼之，血虛痛甚，散尤宜。如經年紫黑者，先用爐灰膏去瘀，○**斬艾膏**：斬艾、川椒

各五錢，水粉一兩，黃丹三錢，輕粉一錢，爲末，熟麻油調膏，隔紙貼之，効。○**蠟磐紙綿紙**：疊十二重，看瘡大小剪成方

塊，以紙擦釘住，却用麻油二兩，入川椒四十九粒，慢火煎，枯黑去渣，入槐枝四十九寸，煎枯黑去渣，入黃蠟一兩，枯

磐一錢，輕粉二分，俟溶化，卽入煎紙，浸透勿使焦，黃

取起貼時，用槐枝葱椒煎湯洗拭，取煎紙齊水貼上，外另

用油紙緋綃緊縛，過時取下，近瘡紙一重，候紙取盡，則瘡

胎髮如梅大熬消化入白膠香黃蠟各一兩溶化入生龍
骨赤石脂血竭末各一兩攪勻候冷磁器收貯每用捏作
薄片貼瘡上外以藥末給帛車之三日後
番過藥貼以活血藥煎湯洗之外膿亦妙瘡疥活血四物

樺皮首烏當歸連歸可殄活血四物湯當歸川芎芍藥生

錢蘇木八分連翹黃連防風甘草各六分水煎服治諸疥
瘡經久不愈○樺皮散樺皮枳殼各燒存性四兩杏仁水

煮熟荆芥穗各二兩炙甘草五錢為末每服二錢溫好酒
調下治肺臟風毒遍身瘡疥及癰疹瘙癢兼治面上粉刺

風刺○何首烏散何首烏荆芥防風蔓荊子藏蘘仙蛇蝎
草甘草各一兩為末白湯調服二錢治脾肺風毒頭面遍

身癰疥瘙癢及紫白癩風肌肉頑麻等症○當歸飲當歸
白芍川芎生地防風荆芥茯苓各一錢何首烏黃芪甘草

各五分姜煎服治遍身疥癰或腫或痒或膿水浸淫或發
赤疹癰癤皆心血凝滯內蘊風熱所發○當歸丹當歸五

錢黃連一錢半太黃二錢半甘草一兩為末先以當歸煎
成膏和丸胡椒大每二十丸食前米飲下漸加至利為

度治疥瘡血熱便秘及疹痘已出聲啞喘急便秘等症
 連歸湯黃連當歸各一錢連翹黃芩各七分升草三分黑
 瘦人合四物湯加大楓子黃柏肥白人加荆防羌活白芷
 蒼朮取其能勝濕也稟受實者合四物湯加大黃芒硝水
 煎服治諸瘡痛瘡疥摩風一上吳茱萸草三黃硫黃任充蛇床子

五錢木楓子十四箇杏仁廿箇枯礬樟腦各二錢川椒輕
 粉水銀各三錢雄黃一錢半銀珠一錢為末用烏柏油三
 兩研勻為丸彈子大磁器收貯每用少許呵洋通擦之治
 疥癬風癩諸濕痒瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡火丹諸般惡瘡
 一止散雄黃三錢半寒水石白膠香黑狗脊蛇床子各
 一兩枯礬黃連各五錢吳萸硫黃各三錢琥珀七箇為
 末先以湯洗去瘡痂後用臘月猪油調手掌心擦熱覺
 中嗅二三忘却擦上一擦即愈治濕疥腫痛作痒臭爛
 吳茱萸散吳萸白礬各一錢寒水石二錢半蛇床子三錢
 黃柏大黃硫黃輕粉各一錢攪柳一箇樟腦五分為末香
 油調敷治乾疥及春月發者宜此開鬱為主一剪草散寒
 水石蕪荑各二錢剪草枯礬吳萸黃柏各一錢蒼朮厚朴

雄黃各五分蛇床三錢輕粉一錢為末香油調敷治沙疥

○三黃散黃芩黃連大黃各三錢蛇床子寒水石各三兩

黃丹五分白礬一錢輕粉白芷無名異木香各少許為末

須先洗刺破油調敷之治膿窠瘡退熱消腫止痛乾膿結

痂一硫黃餅礬製硫黃一兩為末用水調成餅貼磁器碗

底覆轉用蘄艾一兩川椒三錢為末火燃薰乾硫黃臨用

先以柳桃桑椹楮五枝煎湯洗拭然後用麻油調硫黃末

搽之治虫瘡及冷瘡毒就火灸湯泡者○抑老退熱治乾

痒出血須用芩連大黃或松香樟腦退腫止痛須用寒水

石白芷止痒殺虫用狗脊或蛇床子枯礬殺虫用蕪荑水

銀硫黃甚者加藜蘆瑇瑁乾膽用無名異松皮炭頭瘡加

黃連方解石脚上用黃柏陰囊用吳萸紅色用黃丹青色

用青蘗毒就火與熱湯用硫黃頑癬浮萍為君頑癬九浮

濕瘡用香油調乾瘡用猪油調頑癬浮萍為君浮蒼木蒼

耳各一兩苦參一兩半黃芩五錢香附二錢半為末酒糊

為丸白湯下○古痔蛇九浮萍半片烏梢蛇三錢為末蜜

丸重六錢三日服一九用風藥洗身上隨量將

酒嚼下取汗九日服三九大麻風癰亦効忌鹽血風馬莧

可覓

大馬齒莖馬齒莖焙乾五錢黃丹黃柏枯礬兒茶各三錢輕粉一錢為末生桐油調攤油紙上用葱椒煎

湯洗淨患處貼之治兩足血風瘡并兩足背風濕癢痛痒至骨者效

癩風

初起吐下醉仙丹

造莫遲疑

醉仙散胡麻子牛蒡子蔓荊子拘杞子各一兩俱炒紫色白蒺藜苦參瓜蒌根防風各五錢輕

粉四錢為末每一錢早午晚各茶清調服服後五七日間

先於牙縫內流出臭涎渾身覺痒皆因如醉後利下臭屎

膿血為効量大小虛實服之治大風病遍身癢疹癢痒麻

木或去輕粉量體加茶連可調理餘毒再造散大黃卑

刺各一兩白牽牛六錢鬱金五錢一方無此二味為末每

五錢或二錢五更酒調面東服之當日利下惡物或膿或

虫如虫皆黑色是多年赤色是近日數日後

大蘇紫雲補

又進一服去虫積盡乃止大治癩風惡疾

瀉參蛇蠍痺換肌骨

大蘇風丸苦參三斤羌活獨活白芷白藜白蒺藜天花粉何首烏各四兩

皂刺煨當歸各半斤為末用皂角五斤切細溫水浸五日

去查慢火熬成膏和九梧子大每百丸空心酒下治大疥

風初起遍身瘡黑五色不知痛痒手足麻木等症。紫雲
風丸何首烏四兩五加皮羌活獨活白芷細辛生地漢防己黃連芍藥
兩半牛蒡子羌活獨活白芷細辛生地漢防己黃連芍藥
蟬退防風荆芥蒼朮各一兩爲末煉蜜或酒糊丸梧子大
每七十丸溫酒米飲任下治血分受濕遍身發紫血疱痛
痒有虫若白水疱則爲天疱瘡乃此類之輕者。○補氣瀉
營湯升麻連翹各六錢蘇木當歸黃連黃芪全蝎地龍各
三分黃芩生地各四分人參二分甘草一分半桔梗五分
桃仁三枚水酒各半煎減半入麝香少許胡桐淚一分蜜
水蛭各三枚白豆蔻二分再煎熱服或爲丸亦好治太
風滿面連頸極痒眉脫鼻崩膚敗宜辛溫散血并溫補氣
兼瀉胃熱心火以止痒補肺以升陽外用針砭去惡血忌
酒麪生冷物。○活神丹羌活玄參當歸熟地各等分爲末
蜜丸梧子大每五十丸空心白湯下大風病血虛者可常
服之。○加味苦參丸苦參一斤防風荆芥蒼朮身子胡麻子
皂刺各十兩蔓荊子牛蒡子黃荊子枸杞子何首烏禹餘
糧蛇床子各二兩白芷一兩半爲末用皂角煎膏和丸梧
子大每五十丸茶酒任下治大風瘡及諸風赤白癩風。

車苦參酒 苦參半斤洗淨剉碎將絹袋兜浸酒二壺春冬
浸一月秋夏浸十日每飲一小鍾日三次大能消一切風
熱瘡毒理脾補心養氣瘡科聖藥如酒盡以苦參晒乾爲
末酒糊丸服尤妙○三蛇丹土桃蛇烏梢蛇白花蛇各一
條苦參四兩爲末用皂角煎膏爲丸梧子大每六七十丸
煎防風通聖散下○飯壓之日三服三月一洗乃安治大
風手足麻木髮脫眉落遍身瘡疹癢痒一切疥癬風痰皆
效○白花蛇丸白花蛇一條當歸二兩川芎白芍生地防
風荆芥酒蒸連翹胡麻子何首烏升麻羌活獨活各一兩
爲末將浸蛇酒和水打糊丸梧子大每七十丸茶清下治
頭面手足白屑瘡痒皮膚皴燥○獨活散羌活獨活皂刺
白芷各五分當歸白木各一錢半赤芍一錢土茯苓五錢
水煎服治癩風肢節拳攣宜此養血祛風○換肌散烏梢
蛇白花蛇地龍各二兩細辛白芷天麻蔓荊子當歸苦參
藏靈仙荆芥穗并菊花紫參沙參木賊不灰木炙甘草沙
苑疾藜天門冬赤芍定風草何首烏石菖蒲胡麻子草烏
蒼木川芎木鱉子各一兩爲末每五錢溫酒調服治癩風
年深不愈以致眉髮脫落鼻衄崩潰重者方可服之○換

骨丸 苦參 浮萍 各一兩半 大黃 槐花 白芷 川芎 各一兩 二錢 蒼朮 一兩 乳香 沒藥 沉香 木香 各三錢 麝香 五分 爲末 用麻黃五斤 煎膏和 左彈字 大每一丸 臨臥溫酒化下 忌風 二三日 兼治一切疥癬風疾 一方去蒼朮 加當歸 防風 甘松 白花蛇 虎骨 凌霄花 散 凌霄花 五錢 蟬退 地龍 秦蠶 全蝎 各七枚 爲末 每二錢 酒調服 服後於浴室中坐 在湯內 一時許 服藥則効 治諸癩風症 浴癩方 用桃柳桑槐楮五枝 各一片 煎濃湯 一桶 先煮候半溫 坐桶內 平頸項浸洗 一日一月 洗兩 楊梅輕減通聖丸 搽洗何須幾 次 極妙 一切瘡疽亦効 楊梅輕減通聖丸 搽洗何須幾 遭 加減通聖散 防風 白蘇皮 赤芍 連翹 黃芩 各八分 牛蒡子 一錢 金銀花 三分 山梔 歸尾 各五分 荆芥 槐花 各四分 羌活 蠶甘 草 各二分 水煎服 如初起便秘 加酒大黃一錢 半 便難 加皂子 三分 胃弱食少 加白朮一錢 陳皮 半 夏 各五分 頭上多 加川芎 八分 薄荷 一分 下部多 加牛膝 黃柏 各四分 臨身多 加木通 桔梗 地骨皮 各六分 心火 加黃連 腎火 加玄參 各四分 氣虛 加參 芪 血虛 加熟地 各六分 久虛便利 加硬飯五錢 加減通聖丸 卽前方共半片 再加

苦參半斤為末酒糊或蜜丸梧子大每七十丸空心米飲
溫酒任下○搽藥杏仁十四枚針桃火上燒半生半熟輕
粉一錢片腦二釐為末猪膽汁或香油調搽不畏痛者加
膽礬三分磨風膏亦好○洗藥土也骨皮荆芥苦參細辛
各五錢煎湯先蒸後洗遍身出汗為
効如洗務要湯寬浸洗良久方佳
楊梅重多化毒散吹

藥限定三日

化毒散生大黃一兩鮮熟毒穿山甲五錢虛
者三錢解毒姜蜜二錢去風蜈蚣一條去虫

歸尾五錢破血為末每二錢酒調日二服○吹藥黑鉛八
分溶化入水銀一錢同結成餅銀珠一錢半炒明礬雄黃
各一錢為末棗肉搗勻分作六丸每用一丸放火籠內
病人以巾包頭口吹眼看其藥丸待烟盡則止當日早午
晚各吹一丸次日早午吹二丸第三日只早吹一丸吹後
三五日或口流涎以黃連葉煎湯解之又服化毒散三
日後以加棗通聖
散丸調理漸根
皂刺皂根頑癬筋疼可祛
何首烏石南藤白茯苓五加皮地骨皮白鮮皮各十錢草
烏枸杞牛蒡子歸尾五靈脂蔓荊子胡麻子防風苦參虎

膠膏地龍京墨木鱉天花粉各五錢白膠香乳香沒藥各
三錢痛甚加麝一字為末麪糊為丸梧子大每五十九硬
飯湯下日二次服兩月斷根忌狗肉魚腥房事治遠年楊
梅癰癰頑瘡筋骨疼痛○皂根丸當歸二兩黃芪一兩半
人參勸艾各一兩麻黃五錢皂角樹根皮四兩為末蜜
丸梧子大每五十九丸土茯苓煎濃湯下治楊梅風毒○
仙遺糧湯土茯苓一兩乾者七錢

銀象牙大楓癰漏如失

防風木瓜木通薏苡仁白蘚皮金

銀花各五分皂子四分水煎空心日三服治楊梅風毒及
誤服輕粉以致癰癰筋骨疼痛不能動履或壞肌傷骨者
服此除根永無後患凡患下疳瘡者宜此預防之如氣虛
加參芪血虛加芎歸熟地牛膝肺熱去土茯苓倍薏苡仁
金銀花○仙遺糧丸土茯苓一兩防風木通薏苡仁防七
白茯苓金銀花木瓜白蘚皮皂刺各五錢白芥子四錢當
歸身七錢為末蜜丸或浸酒服忌生冷煎雞煎炒茶酒房
室十餘日治楊梅瘡後腫塊成癰如虛弱者加人參五錢
甚妙○單仙遺糧丸一味為末蜜丸梧子大每五十九丸
煎湯下治楊梅瘡或鼻崩眉落筋緩骨牽者皆效○象

牙丸象牙三錢驚甲蠟皮各一箇為末棗肉左櫻桃大每
一丸空心小便化下服七日後仍用三味為末猪膽汁調
敷浴楊梅瘡成漏○大楓子肉半斤荆芥當歸苦
參各半兩半羌活獨活防風蟬退全蝎各一兩為末用大
楓子壳煮汁和晚米糊丸梧子大每百丸日三次溫酒下
但大楓子性熱燥痰傷血服多病愈失明用者慎之○取
輕粉法用開口川椒每空心以土茯苓煎湯吞下廿粒即
利輕粉於椒內從大便出洗起川椒服至椒內無輕粉乃
止○治天庖瘡方用野菊花棗木根煎湯洗洗後用防風
通聖散同斷頭泥為末罌口蜜調敷之極效或只用黃柏
滑石為末油調敷之如從肚皮上起者
裏熱發外宜內服防風通聖散加減

提方寶金外治十

種有三

提方寶金子雄黃酥砂各三錢青鹽砒霜白丁香輕
粉與硫各一錢半蟾酥麝香各一兩華麻子廿粒

為末用黃蠟溶化和在梧子大捻作錠子用針刺破疔頭
放一錠於疔上又刺四邊五七下令惡血出為妙却用水
粉膏貼之內服寶命丹治疔瘡危篤發背兼治瘰癧○寶
金丹用明礬四兩溶化入黃丹二兩銀釵攪之慢火熬令

紫色色先以針周迴挑破用津液調敷數度無令瘡乾其疔即潰如不潰入信石一錢雄黃硃砂各五分貼之即潰治

種疔瘡追疔保生接命奇功第一 追疔湯羌活獨活青皮防風黃連赤芍細辛甘

草節蟬退姜蠶獨脚蓮各五先將澤蘭葉金銀花金線重樓各一錢生薑搗酒或搗水入酒熱服然後用生薑十

片水酒各半煎前藥熱服衣覆取汗如有膿加首烏白芷要利加青木香大黃在腫加木瓜病減後前藥加大黃二

錢以去餘毒○保生錠子蟾酥三錢雄黃二錢為末用青桑皮一兩同搗如泥為丸六分重捻作錠子硃砂為衣陰

乾如疔瘡用冷葱湯磨服八分仍用冷葱湯漱口熱下外用針刺開疔頭將錠子一分填入疔內被蓋出汗二日爛

出即愈如背發亦用冷葱湯磨服再磨一分敷患處被蓋出汗其患即愈體虛清貴及婦人胎前產後毒瘡者最宜

○蟾肝丸端午日取蟾肝一具入雄黃五錢搗丸黍豆大硃砂為衣每三十九粒酒下善能發汗解毒如痘疹不出用

胡荽酒下最妙○賽命丹蟾酥硃砂雄黃膽礬血竭乳香次藥各三錢蜈蚣麝香各五分細辛全蝎蟬退紫山甲姜

鐵牙各六錢白礬用信少許同枯去信不用片腦各五
分爲末端午日用酒糊丸菡豆大每三九用葱酒一小鍾
吞下後蓋出汗或吐或不汗再進一九服後喫白粥調理
忌黃水水茄一切動風之物治癰疽發背疔瘡乳癰魚口
便毒一切無名腫毒及小兒臍風亦効賽飛龍奪命丹
一檢金卽前賽命丹爲末每服二三分溫酒調下如服賽
命丹後毒未盡定再用此未催之惟疔瘡服此藥後身涼
者卽死○治疔單方蒼耳草一握生薑四兩同搗爛入生
頭酒一碗去渣熱服大汗卽愈或以菡豆野菊花爲末酒
調飲醉臨寢痛定熱除外用蒼耳根莖苗子燒灰爲末醋
淋或醃調塗疔上毒根卽出山鄉疔腫初起緊急無賽命
丹者用此更快又或無蒼耳處用烏柏葉搗汁一二碗頓
服得大便利爲妙冬月用根研水服之以利爲度食災牛
馬患者尤効○五聖湯大黃金銀花甘草各一兩瓜蒌一
箇皂刺二兩每用生薑一兩酒煎服一方去皂刺加當歸
赤芍枳壳治一切疔腫癰疽初覺憎寒頭痛○蜂窠散土
蜂房一窠蜂退一條共入罐中鹽泥固濟火煨存性爲末
每下錢空心酒調服少頃腹中大痛痛止疔瘡化爲黃水

體實者後服五聖湯

折傷損內鷄鳴花藥石

其消

鷄鳴散大黃一兩桃仁七粒梔子五

錢酒煎五更鷄鳴時服取下惡血即愈治墜壓傷損瘀血凝積痛不可忍若氣絕不能言者急以小便灌之即甦

花藥石散硫黃四兩花藥石一兩為末入瓦罐內蓋泥固濟晒乾安四方磚上以炭火自巳午時煨至紅宿候取

出研細破罐盛之如一切金刃及打撲身體出血者急於傷處粉藥其血化為黃水如內傷血入臟腑熱煎童便入

酒少許調服一錢立効如牛觸腸出不損者急送入用桑白皮或生白麻為線縫合肚皮縫上粉藥血止立効並不

得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後粉藥如婦人產後敗血一不盡惡露奔心胎死腹中胞衣不下並用

童便調服○單人中白散火煨醋淬為末折傷見紅歸鬚每五分酒調服治閃挫跌撲傷骨極重者

特霜可室

當歸鬚散歸尾一錢半紅花八分桃仁七分其

水酒各半煎空心服治打撲以致氣凝血結胃腹脇痛或寒熱如挫閃氣血不順腰脇痛者加青皮木香脇痛加柴

胡川芎○古蚌霜散蚌粉百草霜各等分爲末每一二錢糯米飲調服側柏枝研汁尤効治傷損大吐血或因酒食飽低頭搥損吐血過多并血妄行口鼻俱出但聲未失者皆効如鼻衄舌衄及冬瘡出血並用乾糝立止○古烏附湯烏藥一錢香附二錢甘草三分爲末淡鹽湯調服治跌撲吐血不止又能調中快氣治心腹刺痛定痛應

痛稱陣王

乳香定痛散乳香當歸白朮各二錢白芷沒藥甘草羌活人參各一錢爲末每二錢溫酒并童

便調服治打撲墜傷損一切疼痛如血虛者去羌參加川芎芍藥生地牡丹皮○應痛丸草烏八兩生薑生葱各一斤同搗淹兩宿焙蒼朮破故紙骨碎補各八兩穿山甲小茴各六兩爲末酒糊丸梧子大每五十丸溫酒米飲任下忌熱物治折後爲四氣所侵手足疼痛○陣王丹大黃一兩石灰六兩同炒灰紫色爲度去火毒篩過數傷處立効○一方加小兒髮灰乳香沒藥蒲黃各少許爲末用未開水老鼠屎和藥搗爛陰乾爲末不問刀箭出血木石損傷敷之如神且夾骨接骨見醫術○夾骨法小蝦蟆四五箇皮

虎破傷風症

夾骨接骨見醫術

確三分生薑一兩酒糟一

碗腫者加紅肉消同搗爛敷手足折傷之處一方用菴豆粉一匙炒令紫色以熱酒同熱醋調敷損處用竹紙蓋貼將杉木皮或桑皮二片夾定其効如神○小兒驚風小麥麴鎔煉各五分狗頭骨乳香五倍子各一分為末用熱酒調敷痛處不可敷破處重者加天靈蓋少許尤妙爛者只用厚毛草一匙搗爛敷之或以此草煎湯洗亦好○接骨紫金丹土鱉自然銅骨碎補大黃血竭歸尾乳香沒藥硃砂各等分為末每八釐熱酒調服其骨自接治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈及瘀血自下吐血等症如遇經事不調每服加麝七釐即通○接骨丹乳香沒藥各五錢自然銅一兩滑石二兩龍骨赤石脂各三錢麝香一字為末用好酒二碗煮乾就炒燥為末化黃蠟五錢為丸彈子大每下丸酒煎用東南柳枝攪散熱服若骨已接去石脂龍骨即含化下丸亦妙○麻藥方牙皂木鱉紫金皮白芷半夏烏藥土當歸川芎川烏各五兩草烏小茴坐拏草酒煮熟各下兩木香三錢傷重手近不得者更加坐拏草草烏及蔓陀蘿花各五錢並無製煨為末諸樣骨碎骨折出臼窩者每服二錢好紅酒調下麻劑不識痛處或用刀割開或

剪去骨鋒以手整頓骨節歸原用夾夾定然後醫治如箭
鏃入骨不出亦可用此麻藥或鉗出或鑿開取出後用鹽
湯或鹽水煎服立醒○闔齒方點椒五錢天靈蓋紆內消
白芷各二錢為末齒動糝上即安或已落有血絲未斷者
亦可糝藥齒齦間闔之○接指方真蘇木為末敷斷指間
接定外用蠶繭包縛完固數日如故亦治刀矢所傷者

破傷

開關定搐蜈蚣星風及二烏

蜈蚣散蜈蚣二條江鰮
二錢無江鰮以全鰮代

之為末每一錢防風羌活煎湯調服治破傷風搐搦角弓
反張外用搽牙或吹鼻亦好如表解不已傳入裏者當服
江鰮丸○單全鰮散蜈蚣七箇為末熱酒調服凡患破傷
風症非此不除○古星風散南星防風各等分為末如破
傷及金刃傷或打撲內有損傷以藥末敷傷處然後以溫
酒調下一錢如牙關緊急角弓反張及打傷欲死但心頭
微溫者以童便調灌二錢并進二服如顛犬咬先以口含
藥水洗拭糝之更不作膿大效蓋南星為防風所製服之
不康○二烏丸生川烏白芷天麻各二錢生草烏雄黃各
一錢為末酒糊丸梧子大每十九丸溫酒下治破傷風角弓

反張牙關緊急○烏蛇散烏梢蛇六錢麻黃一兩甘草烏乾
姜附子川芎白附子天麻各五錢蝎梢二錢半為末每一
錢熱酒調日三服治
破傷風及洗頭風
破傷止血定疼鱉蠟魚膠與甲質鱉蠟
酒破傷初覺有風時急取熱糞堆內蟾蠟虫一二箇用手
捏住待虫口中吐些小水如緊急只剪去尾將腹內黃水
抹瘡口再滴些小入熱酒內飲之身穿厚衣片時瘡口覺
麻兩脇微汗風出立効虎咬亦宜○魚膠散魚膠燒存性
為末入麝香少許每二錢熱酒米飲任下亦可溶化外敷
治破傷風口緊強直○硃砂指甲散人手足指甲燒存性
六錢硃砂南星獨活各二錢為末分作三
服熱酒調下治破傷風手足顫掉不已
表熱瓜石小芎

而半表無汗審羌榆

瓜石湯瓜薑仁九錢滑石一錢半南
星蒼朮赤芍陳皮各一錢黃連黃柏

黃芩白芷各五分甘草二分姜煎服治破傷風發熱○小

芎黃湯川芎五錢黃芩三錢甘草一錢水煎服治破傷風

表熱○羌麻湯羌活麻黃菊花川芎石羔防風前胡黃芩

細辛枳殼茯苓蔓荊子甘草各五分白芷薄荷各二分半

姜煎熱服治破傷風半表半裏無汗○榆丁散地榆紫花
地丁草防風馬齒莧各等分爲末每三錢溫米飲下治破
傷風半表裏頭微汗身
無汗不可發汗者宜此裏實江鯁大芎而臍和養血兼防

木

江鯁丸野鴿糞炒江鯁燒姜蠶各五分雄黃一錢蜈蚣
二條天麻一錢爲末分作二分將一分燒飯爲丸梧子

大

株砂爲衣將一分加巴霜二分半飯爲丸每用硃砂藥

壯

丸加巴霜藥一丸二服加二丸至便利爲度再服硃砂

藥

病愈即止治破傷風驚而發搐臍臍秘澀邪在裏者宜

此

下之○大芎黃湯川芎一錢大黃羌活黃芩各二錢水

煎

服治破傷風二便秘赤自汗不止○養血當歸地黃湯

當

歸川芎生地芍藥藥本防風白芷各一錢細辛少許水

煎

服治病久氣血漸虛邪氣入胃宜此養血榮筋○白朮

防

風湯白朮黃芪各二錢防風四錢水煎溫服治破傷風

發

表過多臍臍和

而

自汗不止者宜

兩

或加黃芪當歸各五兩尤妙入砂鍋內水二碗慢火煎

至

一碗入酒一大碗煎數沸作三次溫服一日夜喫盡如

病重，一日夜服兩劑，俟大小腸通利，為藥力到。外用忍冬、
藤連花葉木杵搗爛，入酒少許，敷瘡四圍，留中以泄毒氣。
治一切癰毒外發內疽及婦人乳癰，常服托裏消毒方。
用忍冬根、藤花葉置罐內，以酒浸之，煉火煨一宿，取出晒
乾，入甘草少許為末，酒糊丸。梧子大，每百丸，溫酒
米飲任下，消渴後宜服。此藥預防發癰亦主痔漏。**施黃**
蠟加蠟加葱 和勻，衆手急丸。梧子大，每廿丸，食前酒下，日
二服，定痛生肌，護膜止瀉，消毒化膿，及諸內癰排膿托裏
之功甚大。或金右補藥發疽非此莫治。若遍身生瘡，狀如
蛇頭者，每服百丸，大有神效。若蛇蝎及一切毒虫所傷，溶
化熱塗患處，內更服之，其毒即解。為外科癰疽之要藥也。
服至三、四兩後，愈見其功。癰毒潰後服之，甚得腸癰瘰癧
及內科心痛尤效。如漏瘡用丸溶化，加鷄膽、豉、髮灰，未和
勻，成條塞入漏孔。○**葱礬丸** 端午午時取明礬為末，酒
磁器盛之，遇腫毒初起，用末三錢和葱白搗勻，酒調服，盡
量一醉，或吐以茶壓之，或飯與葱搗丸服，亦可。外用礬末
五錢，麝香一分，取蝦蟆腸肚和藥搗膏敷瘡四圍。一日夜

即愈治諸腫發返魂湯既可加減赤芍木通白芷何首烏
背一切惡瘡

草各五分水酒各半煎湯使隨症用之治血氣逆於肉理

故令壅結癰疽最宜調和榮衛但此方宜與內托十宣散

相間用之並加忍冬藤最治內癰但當審其虛實或通或

補之則用附子通則用大黃如不明虛實則此方亦能通

順可無他變惟流注加獨活毒重加

穿山甲全蝎蟬退連翹隨症加減化毒仍要折衷黃

牽牛槐花白芷穿山甲蜈蚣蕪荳全蝎雄黃硃砂蟾酥明

礞鉗丹各等分爲末米糊丸梧子大每八九粒酒下癰疽

初起用之痛極乳香肉服口渴竹葉見効乳香止痛散粟

發汗如神

兩灸甘草陳皮各二兩沒藥乳香各一兩丁香五錢每五

錢水煎服治瘡腫疼痛不止竹葉黃芪湯淡竹葉生地

各一錢黃芪麥門冬當歸川芎甘草黃芪芍藥人參半夏

石羔各五錢水煎服治癰疽氣血虛胃火盛而作渴等症

潰甚聖愈作主食少參芪收功聖愈湯生地熟地川芎人

錢水煎服治癰疽膿水出多心煩睡卧不安五心煩熱等症
○人參黃芪湯人參白朮陳皮蒼朮麥門冬當歸各五

分黃芪一錢升麻六分黃柏四分神麴三分水煎服治潰後少食不眠發熱等症
○蒜灸以拔毒

隔蒜灸法先以濕紙覆上立候紙先乾為蒜頭記定然

後用獨蒜去兩頭切中間三分厚安蒜頭上用艾炷於蒜

上灸之每五炷換蒜再灸如瘡大有十數頭依此處生者

以蒜搗爛攤患處鋪艾炷蒜敗再換治一切癰疽腫毒大

痛或不痛或麻木若痛灸至不痛不痛灸至痛其痛乃隨

火而散此拔引營毒從治之法有回生之功若瘡色或白

或紫不起發不大痛不作膿不問日期最宜多灸未成者

消已成者殺其大勢○豆豉餅淡豆豉為末用唾津或漱

口水和作餅如錢大半分厚置患處以艾炷餅上灸之餅

乾又易治癰疽腫硬不潰上而不斂并一切頑瘡惡瘡未

成即消已成即潰不斂者氣血虛敗也
○桑葉熨以祛風

桑葉炙法治發背不斂者氣血虛敗也
○桑葉熨以祛風

背吹息火焰以火頭灸患處日三五次每次片時取瘡肉

腐動為度若腐肉已去新肉生遲宜灸四圍陰瘡瘰癧流

注腫瘡寒邪所襲久不愈者尤宜用之未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣其陽症腫痛熾甚或重如負石初起用之水出即消其經數日者用之雖潰亦淺且無苦楚○葱熨法生葱搗爛炒熟頻熨患處至冷再換治流注結核骨癰鶴膝等症先用隔蒜灸餘腫尚存用此發之以助氣血行壅滯其功甚大又跌撲損傷止痛消腫散血之良劑也

洗毒肉汁易求

洗毒散蛇床子地骨皮紫花地丁草麻黃荆芥防風枯礬各三錢葱白三根水三碗

煎至二碗於無風處洗之治諸般惡瘡及風濕陰蝕瘡○

肉汁湯白芷甘草羌活蜂房黃芩赤芍當歸各一錢用猪

蹄爪肉一斤煮汁分二次去油花肉查方入煎藥煎十沸

俟溫以絹蘸湯揩洗惡血隨洗而下忌風冷婦人猶大治

一切瘡

疔有口

點瘡爐灰當審

化石灰一升炒紅以竹箕盛貯用

滾湯三碗慢慢淋自然汁一碗銅鑊盛慢火熬如稀糊先

下巴豆末次下蟾酥各二錢白丁香末五分炒石灰一錢

攪勻再熬如乾麪糊取起俟冷以磁罐盛貯勿令泄氣每

用時以簪頭挑少許放指甲上研口呵氣調勻如泥將患

用針撥開以藥點之治一切無名腫毒惡瘡及外痔瘻

瘻氣栗除癰點惡等症有膿者就散無膿者就散惟好肉及

眼上忌用如點癰癰去膿加輕粉一錢要痛加乳香沒

藥各一錢尋常消癰點惡只用灰膏不必加藥○去惡散

雄黃一錢巴豆一箇同研如泥入乳香沒藥各末少許又

再研勻如諸瘡毒有惡肉不能去者每取少許點上即去

敷分陰陽 陰陽散赤芍生血止痛去風白芷去風生肌止

痛石菖蒲和氣行血能破腫硬五倍子消腫生

肌各二兩獨活三兩止風動血紫荆皮五兩破氣逐血消

腫為末葱酒或醋調敷治癰疽腫毒流注此藥平和故曰

陰陽○抑陽散天花粉三兩姜黃白芷赤芍各一兩為末

茶湯任調敷治癰疽屬陽症○抑陰散草烏一兩白芷赤

芍南星各一兩肉桂五錢葱湯或熱酒調敷治癰元氣虛

寒腫不消散或不潰斂或筋攣骨痛一切冷症神效○鷄

血散用雄雞剪去冠尖少許剉提滴血瘡上血盡再換不

過五六鷄痛止毒消其瘡自愈內以人參六兩分作六次

煎服治癰疽屬陰症○鐵縮散乳香沒藥各末少許又

艾葉南星半夏防風羌活皂刺木鱉子瓜蒌根阿膠甘草

節草烏各等分爲末醋調成膏砂鍋內火熬黑色敷之寒者熱用熱者寒用治癰疽腫痛赤暈散漫及諸般瘡癤○
鉄井欄芙蓉葉重陽前採蒼耳葉端午前採燒存性爲末蜜水調敷一切腫毒背癰以此藥圍定不復畔開○單巴
豆膏巴豆炒焦研如膏須臾用製之度不乾燥如發背中
央肉死塗之卽腐未死塗之生肌惡瘡腫瘡久不收斂內
有毒根以紙撚蘸藥納之根去卽斂元氣虛弱或因冠茂
胃氣以致毒氣散漫中央肉死急服大補之劑中塗三四
寸許至五六日赤點之界自裂紋如刀割狀中央漸潰若
脾氣大虛肉不知痛急補脾胃肉多復生○單小粉膏用
隔年小粉愈舊者愈好不拘多少入鍋炒之初炒如錫燂
久則乾成黃黑色候冷爲末陳米醋調令稀稠得所以磁
罐收貯如一切癰疽發背無名腫毒初發微熱未破者量
所腫大小用厚皮紙攤開中剪一孔以泄毒氣貼上卽如
冰冷疼痛卽止少頃覺痒不得揭動久則腫毒自消其効
如神○單糯米膏揀淨糯米三升入磁盆內於端午前四
十九日以冷水浸之一日兩度換水時以輕手淘轉勿令
米碎至端午日取出用絹袋盛之風乾每旋取少許炒黑

為未冷水調成膏量瘡口大小貼之縮帛包定直候瘡愈
為度若金瘡誤犯生水瘡口作膿急以此藥裹定腫處已
消直至瘡愈若癰疽毒瘡初覺微腫吐膿貼之項下及腫
處若竹木簽刺入肉者臨卧貼之明日其刺出在藥內若
貼腫毒乾即換之常令濕為妙

線有三品

上品錠子專治
二十種痔漏

紅礬二兩半乳香沒藥各三錢牛黃五分半硃砂一
錢熟四分生白信火煨一兩○中品錠子專治翻花瘰癧

等症白礬三兩八錢半乳香沒藥各五錢半硃砂三錢牛
黃七分半硃砂五分熟五分生金信一兩半火煨黑烟止

用淡清烟○下品錠子專治發背疔瘡等症紅礬三兩二

錢乳香六錢沒藥五錢硃砂三錢牛黃四分半硃砂二錢

四分半熟半生白信三兩火煨黑烟盡半日取起用各依

法製為末麪糊和勻捻成錠子看瘡漏大小深淺插入錠

子如肉內黑色勿上生肌散直待黑肉去盡方可上生肌

散若瘡無頭者用太乙膏加沒藥一粒貼之白礬二兩乳

香三錢二分沒藥三錢七分硃砂四分半牛黃五分白信二

兩火煨烟盡半日取用巴霜三錢白丁香二錢半姜黃三

43

錢半爲末或噀津調敷一日換三次但瘡破插上前錠子

○通用青金錠子銅綠三錢青礬膽礬輕粉砒霜白丁香

苦葶藶各一錢片腦麝香各少許爲末麪糊或煉蜜加白

及末爲錠子如麻黃大二三寸長看瘡口深淺插入疼者

可治不痛者不治如開瘡口用生砒去死肉用煨砒生好

肉去砒加枯礬○取久疽久痔漏中朽骨法用烏骨雞脰

骨以信石實之鹽泥固濟火煨通紅地上出火毒取骨爲

末飯丸如粟米大以皮紙燃送入竅內外用膏藥封之其

骨自出

取膿射膿透膿 隔皮取膿法驢蹄肉焙着麥粉炒各

一兩白鹽五錢草烏四錢爲末水調

作餅慢火炙微黃色去火毒爲末醋調成膏攤厚紙上貼

患處水自毛孔而出其腫自退諸般腫毒皆效○射膿法

枯礬黃丹各一錢砒霜五錢爲末麪糊爲丸捻作錠子每

用粘藥於頭欲出處以膏貼之自潰治諸瘡癰膿水已成

卽當針開決出陳臭惡痰若惡痰不出須當用此藥以射

其膿○又方用陳壞米一錢硃砂五錢白丁香廿一粒爲

末粳米粥丸粳米大每用一丸粘瘡上以膏貼之其膿自

潰○透膿散蠶繭一箇燒灰酒調服卽透一箇瘡口若用

兩三箇，即透兩三箇瘡口，或用黃蠟作小丸服之，俱不可多服。治諸癰瘡及附骨疽，不破者，不用針刀，一服即破。

生肌完肌平肌

生肌定痛散，乳香沒藥龍骨硃砂雄黃各一錢，血竭兒茶海鱉鱗各二錢，赤石脂五

錢，白芨白欬各一錢半，片腦一分，或加天靈蓋一錢，為末，搽之，外貼膏藥，生肌止痛如神。○生肌長肉膏，龍骨三錢，

白芷二錢半，血竭二錢，黃丹辰砂各五錢，石炭一兩，樟腦少許，為末，先將黃蠟一兩溶化，入香油少許，然後入藥末，

攪勻，得所，捻成條子，塞瘡口，內肌肉自長，如痛甚，加乳香沒藥各二錢。○完肌散，定粉枯礬黃連乳香龍骨各二錢，

黃丹輕粉各一錢，為末，搽之。○平肌散，狗頭骨露蜂房頭髮各燒存性，一錢，桑白皮五分，麝香輕粉各少許，為末，

津液調敷，治漏瘡及一切癢痛，經久不愈。○易簡方，端午日採一去半，含花藥量入古墳內，舊屋脊上，舊船底上，三

樣石灰搗爛，陰乾為末，乾搽乾者，麻油調搽，不問金刀跌撲狗咬湯火所傷，神效。○斷血金毛無踪

斷血藥，金毛狗脊一兩，明礬三錢，血竭少許，為末，搽上其血即止。○又方，寒水石花藥石龍骨黃丹沒藥各五錢，黃

藥子七錢半，一方加白芨、乳香、輕粉為末，敷上以絹帛扎定，治金瘡出血不止及諸瘡疼痛膿血不乾，久不生肌。

飲口水攪有雀

飲口水藥輕粉、木香、黃連、白芨為末，臨肉痛

氣舒泄，未盡必於其傍復發大疽。○古香柳散：木香、檳榔各等分，為末，糝上乾者，蠟油調塗生肌。飲肉止痛甚速。一方加黃連、當歸各等分。○單方：用經霜桑葉為末，頻糝治瘡大，密不飲外，又以桑葉煎湯洗之，或加白欬、白芨、鷄脰胚之類，亦好。

外貼內服太乙雲母麒麟芳神應萬應千槌欲成

丹

太乙膏、玄參、白芷、當歸、肉桂、大黃、赤芍、生地各一兩，用油二片半浸夏三冬十，春秋七日，方入銅鍋內文武火

煎至藥枯黑，濾去渣，入黃丹十二兩，以桃枝不住手攪，煎至滴水成珠，軟硬得中，即成膏矣。治一切癰疽腫毒，不問年月深淺，已未成膿者，並宜如發背，先以溫水洗拭，攤紙鋪貼之，更用冷水送下，血氣不通，溫酒下，赤白帶，當歸煎酒下，咳嗽及喉閉，纏喉風，綿裹含化，一切風赤眼，貼兩太陽穴，更以山梔煎湯下，打撲傷損，外貼內服，陳皮煎湯下。

膠痛外貼內服鹽湯下唾血桑白煎湯下婦人經閉腹塊

作痛貼之經行痛止一切疥瘡別煉油少許和膏塗之虎

犬蛇蝎湯火金瘡傷並外貼內服諸瘰癧漏瘡瘡癰及楊梅瘡

毒潰爛先用鹽湯洗淨貼之並用溫酒下三五十九

大以蛤粉為衣其膏可收十年不變愈久愈烈雲母膏

川椒白芷赤芍肉桂當歸菖蒲黃芪白朮川芎木香龍膽

草白藳防風厚朴桔梗柴胡人參蒼朮木黃芩附子茯苓良

姜百合皮松脂各五錢甘草柏葉桑白皮槐枝柳枝陳皮

各二兩用膏油四十兩浸封七日文武火煎以柳木不住

手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥枯黑

漚去查再熬入黃丹廿兩沒藥並花血竭麝香乳香各末

五錢雲母硝石各末四兩以槐枝不住手攪滴水成珠不

軟不硬為度磁器收貯候溫將水銀二兩以絹包定以手

細彈鋪在膏上各養膏母用時先刮去水銀或九梧子大

服或攤絳布上貼隨宜用之如發背敗瘡煎湯洗拭貼之

內服一兩分三次溫酒下未成者即愈乳癰瘰癧瘰癧骨疽毒

穿至骨外貼內服一兩分三次酒下甚者即瀉惡物腸癰

內服五兩分五次甘草煎湯下未成膿者消已成膿者隨

藥下膿下後每日仍酒下五丸膿止住服發頤發發發
發耳臍癰牙癰牙疼癰癰及一切癰癰腫毒並外貼即時
毒消痛止而愈甚者內服風眼貼兩太陽穴小腸氣茴香
煎酒下一分日二服即愈難產溫酒下一分血暈欲死姜
汁和童便溫酒下十九丸即醒死胎榆白皮煎湯下五錢即
生壁虎蜈蚣咬外貼留瘡口虎豹咬并草煎湯洗拭貼之
每日換蛇犬咬外貼內服十九丸生油下箭頭入肉外貼
每日喫熟棗豆少許箭頭自出中毒藥酒下一分每日下
服四日瀉出惡物立瘥但有所苦藥到即愈忌羊血餘無
所忌如收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可收三十年不
損藥力○麒麟竭膏當歸木鱉肉知母五倍子細辛白芷
各五錢槐柳枝各十四寸一方用山茨菇紅芽大戟巴豆
各五錢用香油三兩半同煎入朱入鍋內文武火煎以柳
枝不住手攪煎至藥枯黑濃去渣入松香末十兩噤清未
二兩仍不住手攪如沸溢即下火攪之再上火一茶頃滴
水成珠不乾不硬即入血竭三錢輕粉麝香各二錢雄黃
四錢乳香沒藥各末五錢徐徐而下速攪極勻疑則再上
火勿令沸溢傾入水中浸半日後以手搏之漸漸軟和希

覆探扯如金絲之狀再入水浸之如前探扯春夏頻換水
多浸愈妙緊急亦浸兩宿治一切癰疽五發毒瘡生者貼
之即散熟者即穿透敗生肌首尾可用一切疔腫結核並
貼患處膿瘡先用薑汁白礬入湯洗淨以牛蒡子葉或金
剛藤葉先貼半日取盡惡水然後貼膏刻日可愈一切腎
服黃蠟痒痛等瘡並洗拭貼之一切打撲傷損閃到氣悶
等症並貼患處頭疼貼兩太陽穴赤眼貼眼胞魚尾暴傷
風冷嗽貼背心牙疼剉藥塞牙縫面腫貼面小兒疳疔等
疾為丸菉豆大米飲下二三十九一切風寒濕痺臂腿疼
痛俱貼痛處無不立效○神應膏香油一片入亂髮一團
鷄子大於鉢中文武火熬至髮枯入杏仁一兩再煎枯黑
灑去渣入黃芪七錢半玄參五錢熬一二時久住火候火
力稍息入帶子蜂房一兩蛇退五錢或柳木不住手攪慢
火熬至枯黑灑去渣入黃丹五兩不住手攪勻滴水成珠
不軟不硬磁器收貯隨意攤貼治諸般癰腫癰毒外科神
藥人多忽之○萬應膏木香川芎牛膝生地細辛白芷秦
朮歸尾枳殼獨活防風大楓子羌活黃芩南星草麻子半
夏蒼朮貝母赤芍杏仁白蘇葶香兩頭尖艾葉連翹川烏

甘草節肉桂良姜續斷歲靈仙荆芥藁本丁香金銀花丁
皮藿香紅花青風藤烏藥蘇木玄參白鮮皮姜蠶草烏桃
仁五加皮山柝牙皂苦參穿山甲五倍子降真節骨碎補
蒼耳頭蟬退蜂房鱉甲全蝎麻黃白芨各一兩六黃二兩
蜈蚣廿一條蛇退二條桃柳榆槐桑練楮七樣樹皮各廿
一寸用麻油十二斤浸春五夏三秋七冬十日方入銅鍋
內文武火煎至藥枯黑瀝去查磁器內貯另用松香一斤
溶化入前藥油二兩同製滴入成珠不軟不硬仍瀝入水
中番覆揉扯如金色即成膏矣治一切風氣寒濕手足拘
攣骨節酸疼男婦人瘡積女人血瘕及腰疼脇痛諸般疼痛
結核轉筋頑癬頑瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫硬未破
者俱貼患處肚腹疼痛瘡痢俱貼臍上痢白而寒者尤效
咳嗽哮喘受寒惡心胃膈脹滿男婦面色痿黃脾胃等症
及心疼俱貼臍前心負重傷力渾身拍痛者貼後心與腰眼
諸疔小腸氣等症貼臍下神效○千槌膏白松香一斤草
麻仁杏仁各二百粒銅青三兩乳香沒藥各一兩半輕粉
二錢共入石臼內向日下以木杵槌成膏如燥少加香油
搗之磁器內貯每用忌火宜於湯內溶化紅絹攤開貼之

治諸般癰毒無名惡瘡未成者散已成者拔毒追膿如腹中痞塊及癰疾貼大椎及身推穴其効如神 呼膿

長肉白蠟琥珀水粉芳白膏紅膏綠膏如練錦膏麻油二十

斤入桃柳槐枝各七寸頭髮一團鷄子大熬焦枯入當歸黃芪黃連各一兩半黃柏黃芩六黃白芷杏仁防風荆芥羌活獨活連翹山梔各一兩赤芍地黃白及青風藤金銀花各八錢文武火煎至藥枯黑瀝去查入黃丹半片黃蠟五兩瀝青二兩同煎至油滾漸漸加之滴入水中軟硬得所方入乳香沒藥各末五錢血竭輕粉各二錢急手攪勻磁器收貯專治癰疽發背疔癰等毒已破出膿者油紙攤貼如膿多用絹揩淨將此膏於火邊烘再貼第三次另換一箇貼之貼得將口量瘡大小貼之○白蠟膏當歸生地各一兩用麻油一兩煎藥枯黑瀝去查入白蠟或黃蠟一兩溶化候冷攪勻即成膏矣治癰疽發背湯火等症去腐生肌止痛補血續筋又與新肉相宜其効如神或加乳香沒藥龍骨血竭兒茶輕粉尤妙○琥珀膏歸尾川芎黃芪霜蜂房皂角升麻甘草梢單麻子木鱉子芍藥白蔞

獨活、藁本、防風、稍拘杞子、瓜蒌仁、蘇木、白芷、杏仁、黃連、槐枝各一兩，用水五大碗煎至減半，去渣，其渣再用水五大碗煎，至減半，去渣，與前汁和勻，以槐枝不住手攪，慢火熬至成膏，入香油四斤，真酥二兩，羊腎脂油四兩，攪勻，文武煎至水盡，約以紙條燃着不爆為度，方徐徐入黃丹二斤，柳枝不住手攪，滴水成珠，軟硬得所，如軟添形硬，再加油再熬，乃入琥珀、木香、乳香、沒藥、雲母、雄黃、硃砂、甘松各末二錢半，髮灰二兩，枯礬一兩，輕粉、麝香各末二錢，急攪令極勻，微煎數沸，以磁器收貯，厚紙紅絹攤開，量瘡大小貼之，神效。治五發惡瘡、疔腫、癰癤、遠年冷痺、痔漏，一切無名腫毒，及虎犬咬傷，並皆治之。○水粉膏：黃丹半斤，水粉四兩，研勻，用麻油一斤，煎至滴水成珠，次下乳香、沒藥、龍骨、血竭、兒茶、輕粉各末二錢，攪勻，以磁器收貯，攤紙貼之，治癰疽、瘰癧、生肌、斂口，止痛如神。艾炙火瘡，不須下乳，沒等藥便好。○白膏藥：水粉一兩半，赤石脂一兩，樟腦五錢，輕粉二錢半，為末，用生豬脂去膜同搗，成膏，先將生肌散藥上，然後貼之，神效。○紅膏藥：先以黃蠟一兩，溶化，次下香油三錢，黃丹五錢，攪勻，再熬成膏，以磁器收貯，貼諸瘡毒，及湯

火金瘡等傷。○綠膏藥銅青華麻子各一兩松香四兩木
驚子五十箇杏仁五錢巴豆五枚乳香輕粉各二錢為末
搗勻於淨石上用斧槌千餘下成膏收貯水浸旋用治諸
般惡瘡腫毒軟癰。○貼膏藥法如瘡有膿血不淨痴癰閉
礙須用藥水洗淨拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水
膿血流出用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日
三日一換至愈凡洗拭換膏必
須預備即貼之新肉惡風故也
吁瘍醫設天官掌制毒

有方創子手菩薩心誤傷何忍

用禮天官掌瘍醫制
五毒方為外科之祖

拾遺

二香散

紫蘇陳皮蒼朮厚朴扁豆甘草各五分香附一錢
半香茹一錢生姜木瓜各二片葱白二莖水煎熱

服治四時感冒冷熱寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當
風頭疼身熱傷食不化如外感腫滿倍加車前子木瓜

紫蘇湯

即小柴胡湯合四
苓散退熱止瀉

胃苓湯即平胃散合四苓散止瀉利水

荆防敗毒散即人參敗毒散加荆芥防風牛蒡子薄荷煎服治一切風熱丹毒風疹風腫及大頭

病等症如內熱加芩連口渴加天花粉

枳梗二陳湯即二陳湯加枳殼桔梗寬胃膈化痰氣治痞滿

芩連二陳湯即二陳湯加黃芩黃連善化痰降火

梔子乾姜湯山梔七枚乾姜一兩水煎溫服得吐即止治醫以丸藥大下身熱不去微煩蓋丸藥不能

除熱但損正氣邪氣垂危留於胃中而未深入則身熱不去而微煩是用山梔苦寒以吐煩乾姜辛熱以益氣

三白姜棗湯即三白湯加姜棗煎服治汗下後頭項強發熱無汗心滿痛小便不利

八珍湯即八物湯去白朮加砂仁等分姜七片棗三枚水煎服和血氣理脾胃

丁香爛飯丸

丁香三錢莢莢木香各二錢甘草甘松砂仁丁香皮益智仁各六錢香附一兩為末湯浸蒸餅為丸菜豆大每卅丸白湯下或細嚼服之亦可治飲食所傷

三稜消積丸

三稜莢莢炒麴各七錢巴豆和皮米炒黑焦去米青皮陳皮茴香各五錢丁香皮益智仁各二錢為末醋糊丸每十丸至廿丸溫姜湯下量虛實加減得利即止治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

導氣枳實丸

茯苓黃芩白朮黃連各二錢澤瀉二錢大黃一兩枳實神麴各五錢為末湯浸蒸餅丸菜豆大一倍每五十丸至七十丸白湯下治傷濕熱之物不得施化而作痞悶不安

大枳壳丸

枳木厚朴人參青皮黑豆枳壳茯苓木香陳皮白朮半夏麥芽神麴三稜各一兩檳榔大黃各二兩一方有乾生姜五錢為末姜汁糊丸梧子大每三四十丸姜湯下常服美食治一切酒食傷胸膈閉悶痰痛飲食不消兩脇刺痛嘔逆惡心並皆治之

三黃枳朮丸

黃芩二兩黃連大黃神變陳皮白朮各一兩枳實五錢為末湯浸蒸餅為丸黍豆大一倍

每五十丸白湯下量所傷服之治傷肉食濕麩辛辣芽厚之物填塞悶亂不快

木香枳朮丸

木香枳實各一兩白朮二兩為末荷葉煨飯搗丸梧子大每五十丸溫水下破滯氣消食

橘半枳朮丸

橘皮半夏枳實各一兩白朮二兩為末荷葉煨飯搗丸梧子大每五六十丸橘皮煎湯下

治飲食傷脾停積痰飲心胃痞悶如食不消加神麩麥芽氣逆加木香白豆蔻胃脘痛加草豆蔻氣升加沉香

南星丸

南星黃芩酒浸香附蒼朮童便浸各二兩川芎酒浸一兩半山梔炒一兩龍膽草酒浸陳皮連翹蘿

蔔子青黛各五錢柴胡三錢為末神麩糊丸服病眼至春夏便當作餅治

卻痛散

五靈脂蒲黃各五錢當歸肉桂薑蒲朮香胡椒各一兩川烏一兩半每四錢入食鹽米醋少許水煎

溫服治心氣

冷痛不可忍

古玄金散

玄胡索、金鈴子各一兩，為末，每二錢，溫酒或白湯調服。治熱厥心痛，或發或止，或久不愈者。

三味玄胡散

玄胡索、肉桂各一兩，木香二錢，為末。每二錢，姜湯或酒調服。治冷心痛。

三味川練散

川練肉、山梔各一兩，薑黃二錢，為末。每二錢，姜湯調服。治熱厥心痛。

海金砂散

海金砂、滑石各一兩，甘草一分，為末。每二錢，麥門冬或燈心煎湯下。治膏淋。

加減八味丸

熟地八兩，山茱萸、山藥各四兩，茯苓、牡丹皮、澤瀉各三兩，五味子、肉桂各一兩，為末。地黃

膏加蜜丸。種子大，每七八十丸。白湯下。治腎水枯涸，虛火上升，口乾作渴，或舌黃裂，或小便頻數，或口舌生瘡。

或兩足發熱，或痰氣上湧，而後患疸，宜預服之。

紫沈丸

半夏、麝香、烏梅、代赭石、砂仁各三錢，丁香、香檳榔各二錢，杏仁、白朮、木香、沉香各一錢，陳皮五錢，白豆蔻

巴霜各半錢，為末，醋糊丸。黍米大，每五十丸。淡姜湯下。治中焦吐食，由食積寒熱相併。

增損五積丸

黃連肝積五錢脾積七錢心脾一兩半厚朴
肝心脾五錢脾腎八錢川烏肝肺一錢心腎

脾五分乾姜肝心五分肺腎一錢半人參肝脾肺二錢

心五分茯苓一錢半巴霜五分為末蜜丸梧子大初二

九加微酒治積塊不拘臍上下左右通用如肝積加柴

胡一兩卑角卑布各二錢半川椒四錢莪朮三錢心積

加黃芩三錢肉桂茯神丹參各一錢菖蒲五分肺積加

桔梗三錢天門冬青皮陳皮白豆蔻各一錢紫苑川椒

各一錢半脾積加吳萸黃芩砂仁各二錢澤瀉茵陳各

一錢川椒五分腎積加玄胡索二錢苦練肉全蝎附子

獨活各一錢澤瀉菖蒲各一錢肉桂二分丁香五分秋

冬加厚朴一倍莪朮連翹熟加黃連連翹悶亂加肉桂氣

短莪厚朴又有虛人不可直攻以蠲遺其藥又且久

留磨積其肉積酒積痰積等照依纂錄積丹例加減

五仁丸

柏子仁桃仁松子杏仁郁李仁各一兩研膏另用
陳皮末一兩入煉蜜為丸服治血虛大便艱難

五參散

人參玄參丹參沙參苦參各二兩白花蛇一截為
末每二錢空心臨卧酒下治五臟虛風癰瘰惡瘡

鴨頭丸

防已一兩 甜葶藶各五錢 為末 鴨頭血為丸 服蓋鴨頭血能利水而聚血故也

撞關飲子

烏藥一錢二分 香附一錢 砂仁八分 三稜白豆蔻甘草各五分 丁香 香沈香各二分 水煎或為末

服治脹滿用此衝開關格使氣通而滿自消也

雄硃丹

大黑豆四十九粒 約五錢 重端午日以冷水浸從早至巳時去皮晒乾研入信石末一錢 再研勻

糊為丸 少壯人如梧子大 老人黃豆大小 兒菉豆大 雄黃硃砂為衣 晒乾收貯 瘡臨發五更一團東井水下下丸

一補一發丹

茯苓一兩半 夏陳皮 柴胡 黃芩 蒼朮 葛根各七錢 常山二錢 為末 麴糊丸 梧子大 每七十

丸白湯下 治久瘧內傷挾外感 間發內必主痰外以汗解如牙多去葛根氣虛加入參白朮熟甚加黃芩黃連

寒多加草果 口渴加烏梅

別離散

白朮一兩 天雄 附子 肉桂 乾姜 茜根各三錢 茵芋 葉桑寄生各五錢 細辛 菖蒲各一錢 熱者去雄附

姜桂加知母黃柏各三錢當歸地黃各五錢為末空心白湯調服二錢治心風為病男夢見女女夢見男宜此去邪使不復見故云別離

火輪丸

附子乾姜肉豆蔻各等分為末米糊為丸服使脾土運轉如輪五穀易消而大腸傳送有常

金櫻丸

金櫻子一升去穢以酒二升砂鍋內熬膏桑白皮一兩鵝頭實五錢桑螵蛸酥炙一分白龍骨五錢

蓮花露二分為末入膏為丸如梧子大空心溫酒鹽湯下三十九丸更入麪糊易丸治遺精或有咳

烏犀丸

巴豆一百粒八箇去心膜用沉香水浸過橘皮一兩去白切片將巴豆拌和受曉露七夜文武火炒

令黑色揀出巴豆去油盡蒼木不錢去犀皮濃煎犀角水浸受太陽七日晒乾微炒逐將橘皮同碾為末將巴豆和入末內碾勻水浸蒸餅為丸蘿蔔子大量兒大小加減丸數臨臥生薑湯下治小兒驚癇積聚腹大潮熱撮指咬甲蛔蟲自利頸核腹痛遍身瘡疥小便如泔多汗嗜泥炭或癰或渴或吐或瀉或百日內瘰癧血絞刺

啼叫脾虛易為傷犯為疾發生並宜服之常服消宿食破滯氣發散癰毒

百倍丸

牛膝補骨脂龜板各一兩肉苁蓉虎骨各五錢木鱉子乳香沒藥自然銅各一錢為末蜜丸梧子大空心溫酒鹽湯任下三十丸治腎虛腰腿痛風及折傷補損有百倍之効

潤腎丸

蒼朮一片用韭菜一片搗汁拌九蒸九晒又用小茴一片同蒸一次去茴晒乾熟地黃一片五味子半片乾姜冬一兩夏五錢秋七錢虛寒加韭子有火加黃柏各一兩大便燥加黑芝麻四兩為末棗肉丸梧子大空心米飲下五十七丸治脾腎俱虛善退勞熱蓋脾苦燥以蒼朮燥之腎苦燥以姜棗潤之五味收之是也

草還丹

蒼朮四兩用酒醋米泔並水各浸一兩胡蘆巴故紙小茴川烏川練肉各一兩覆盆子二錢木香五錢山藥穿山甲地龍茯苓柏杞子牛膝各二錢為末酒糊丸梧子大每五十九空心溫酒鹽湯任下以乾物壓之大壯脾胃進飲食益精髓補腎經固元陽輕腰脚安五臟通九竅明目悅顏色身軀固齒真延年之劑也

黃芪丸

黃芪、烏藥、茴香、地龍、川椒、防風、川練肉、赤小豆、白

子、大每三十九、空心溫酒下、治腎臟虛風攻、

大黃散

大黃、川芎各一兩、甘草、黃芩、枳殼各五錢、每一錢

取漏膿法

皮硝三兩、苦參一兩半、為末、用布四寸長三寸、

入全藥、裝箱縫袋中、兩頭安皮帶、跨馬繫住、

枇杷葉丸

枇杷葉蜜炙二片、山藥一兩、枸杞子、山藥、黃各

丸、清米飲下、治婦人血崩、經事

紅花湯

水蘊花、茅香、紅花、槐花、白鷄冠花各等分、水

史國公浸酒方

防風、羌活、虎骨、鱉甲、晚蠶砂炒、油松節

牛膝一兩、蒼耳子四兩、枸杞子五兩、野茄根蒸熟晒乾、
入兩各咀細盛布袋中、入大坛內、入好酒三十斤、封
坛口、浸十四日、滿將坛入水鍋懸煮、一時取坛入土內
埋三日、去火毒、每日清晨午後各服五七鐘、大有補益
治半身偏枯、手足拘攣、一切
風疾、神効、衰年除患者亦宜。

固本酒

生地黃、熟地黃、天門冬、麥門冬、人參、白茯苓各四兩、
兩如土熟去入參下、虛寒加韭子二兩、婦人虛寒

用核桃連皮為引、久服生子、如法浸酒服、忌蘿蔔葱蒜
給虛癆身弱、一方去茯苓加牛膝、枸杞黃柏、木香、砂仁、

仙酒方

蒼朮二兩、枸杞、當歸、川芎、白芍、陳皮、天麻各一兩、
晚歸、歸沙、五加皮、杜仲、枳殼、半夏、肉桂、防己、牛膝、桔

梗、木瓜、白芷各五

錢、如法浸酒服之。

五積酒

用五積散去麻黃加防己、杜仲、牛膝、風熱合敗毒
散同浸、查可為丸治虛寒筋骨痠疼、腰脚無力。

婦人小兒外種用藥賦及拾遺

終

△雜病婦人小兒外科總方

○氣類

四君子湯

扶胃降火補虛固本氣虛有熱用之性緩不暴
不助虛陽故稱君子治男子一切內傷外感及

小兒脾胃不調等症若女子氣虛亦宜用之惟血虛
者不宜單服耗血一切大病後最宜服之以調脾胃

人參

一錢補中益氣

白朮

二錢扶胃健脾

茯苓

二錢養心利水氣弱腎無邪水者去之

甘草

六分中和

生薑

三片有汗去之

棗子

一枚水煎不拘時溫服痰加陳皮半夏竹瀝姜

汁虛勞有熱合四物湯內傷停飲目眩去參加官桂

甘草吐瀉加霍香黃芪扁豆泄瀉不止加訶子豆蔻陽

虛加附子脾胃虛弱加官桂當歸黃芪胃冷加附子丁

香砂仁脾困氣短加木香砂仁人參腹脹不思食加白

豆蔻枳實砂仁胃膈喘急加枳實半夏枳殼咳嗽加桑

白皮五味子杏仁心煩口渴倍參加黃芪心煩不定加

辰砂、酸棗仁、遠志、心熱加麥門冬、茯苓、蓮肉、氣痛加玄胡索、小茴、當歸、氣塊加三棱、莪朮、茴香、附子、腹痛加乾姜、赤芍、官桂、遍身疼痛加赤芍、官桂、氣虛成痿加蒼朮、黃柏、黃芩、外感寒熱冬加麻黃、桂枝、三時加防風、羌活、風熱邪加荆芥、黃芩、薄荷、潮熱往來加前胡、川芎、口渴加木瓜、乾葛、烏梅、小便不通加澤瀉、木通、猪苓、大便秘不通加檳榔、大黃、小兒風疾加全蝎、白附子、細辛、疹痘已出未成加升麻、乾葛、婦人產難加麝香、白芷、百草霜、凡病後調理加陳皮、病後虛熱加柴胡、當歸、升麻、餘可類推、量病依藥性、百般加減、由人、又有變方之法、如三白湯、六君子湯、觀音散、異功散、補中益氣湯、及烏藥順氣散、木香勻氣散、七氣湯、凡溫氣快氣行、氣散、氣降、氣破、氣消、氣補、氣清、氣皆自此方而變化之也。

六君子湯

治脾臟不和、嘔吐少食、頭目不清、上燥下寒、服熱藥不得者、即四君子湯加陳皮、半夏、各等分。

甘草減半、姜棗煎服、凡小兒養胃湯、四散飲衛、生湯、托裏清中湯之類、皆自此方而變化之也。

血類

四物湯

調益榮衛滋養氣血治衝任月事不調臍腹疼痛崩中漏下將理失宜胎動不安血下不止及產後

乘虛風寒內搏惡露不下小腹堅痛時發寒熱等症若男子精血虛損發熱亦宜用之蓋女子以血為主而氣為之本氣順則血活氣滯則血死故欲治血當先理氣男子以精為主而血為之本血盛則精強血衰則精憊故欲益精當先補血故二方為男女通用也

白芍

二錢半緩中破血腹痛非此不除心經藥也夏月倍用之當歸二錢潤中和血刺痛如刀非此

不除

腎經藥也冬倍用之熟地二錢半滋陰生血臍痛非此不除肺經藥也秋月宜倍用之男子加此

川芎

二錢清陽和血行血頭痛非此不除肝經藥也春倍用之女人亦倍水煎溫服常服順四時之氣而有

對症不愈者失其輔耳風加羌活防風熱加黃芩燥加天門冬寒加桂心陰虛火動加知母黃柏有嗽加二

陳湯少許老人性急作勞兩腿痛加桃仁陳皮牛膝生
甘草入生薑研落行散熱飲三四貼而安貧勞人秋深
渾身發熱手足皆疼如燬晝輕夜重倍芍芍加人參五
味子如喘手足仍疼加牛膝人參白朮桃仁陳皮甘草
檳榔生薑五十貼而安如性急人味厚常服熱燥之藥
左脇紅點痛必有膿在內加桔梗香附生薑煎服十餘
貼痛處腫針出膿再用數貼調理而安如貧婦性急血
如注倦甚加香附側柏四服覺渴單服十餘貼而安如
懷孕瘡症不能言加硝黃各一錢蜜少許沈冷時時喂
之心火下降肺金自清則能言矣其餘照依藥性類推
及婦人門加減○又如犀角地黃湯當歸和血散凡補
血溫血生血涼血止血行血破血消積血皆自此方而
變化之也

八物湯

治氣血俱虛男婦百症小兒疹痘通用即四君子
湯合四物湯水煎溫服加減同前右痰合二陳湯

名八物二陳湯

凡八物二陳湯之類皆自此方而變化之也

○痰類

二陳湯 痰乃脾胃津液周流運用血氣由之如道路然不可無者濕盛痰多加以外感固滯於中斯為患耳

痰不盛者有感亦輕風寒客之燭以相火則上攻心目而為暗風痰厥暑濕乘之血氣相着附於筋骨而為腫毒癰患怒火迷竅則為顛狂十病九痰誠哉此方總括一身之痰如要上行加引上藥如要下行加引下藥惟

酒痰燥痰不宜

陳皮

二錢和脾消痰利氣

半夏

一錢燥濕豁痰溫中血虛燥症須用姜汁製麴

茯苓

八分行發

參濕甘草

四分健脾瀉火和中

生薑

三片水煎溫服如血虛合四君子湯

身重倦怠加蒼朮寒痰氣喘加杏仁麻黃細辛紫蘇風痰加南星姜蠶皂角痰盛加竹瀝姜汁熱痰加黃芩黃連胃脘痰火加石羔痰結吐不出加瓜蒌仁血痰加黃芩麥門冬知母芍藥竹瀝姜汁胃中鬱痰加香附枳實

胃中老痰及虛痰燥痰去半夏加貝母海粉各病照依藥性類推加減由人○又如星香散導痰湯凡一切行痰消寇痰積之藥皆自此方而變化之也

○鬱類

越麴丸

凡願欲不遂如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧之類或久病不愈皆宜用之

蒼朮神麴川芎山梔香附

各等分爲末水丸棗豆大溫湯下七十丸蓋氣血痰三若

多有兼鬱而鬱有六隨症加減如氣鬱胃脇痛脉浮細合四君子湯血鬱四肢無力能食便紅脉沈合四物湯痰鬱動則喘寸脉沉滑合二陳湯濕鬱周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沈細加白芷茯苓熱鬱小便赤脉沉數加青黛食鬱噯酸腹飽不能食左寸脉平和右寸脉緊盛加山查針砂春諸鬱加防風夏諸鬱加苦參秋冬諸鬱加吳茱○又如六鬱湯流氣飲子四七湯分氣飲之類皆自此方而變化之也

六鬱湯 能解諸鬱

陳皮半 夏川芎 蒼朮 各一錢 赤茯苓 山梔仁 各七錢 香附 二錢

砂仁 甘草 各五分 生薑 三片 水煎溫服 隨症加減

陰虛生內熱湯

當歸 川芎 蒼朮 陳皮 各八分 白芍 山梔 天花粉 各六分 白朮

麥門冬 夏月多用 沙參 各七分 玄參 五分 黃柏 三分 甘草 二分 生薑 三片

水煎服或以山藥代參朮久服去川芎冬月加破故紙此方與下陰分生陽湯義相發明

陰分生陽湯

白朮 七分 白芍 六分 當歸 一錢 甘草 二分 蒼朮 五分 陳皮 八分 生薑 三片

棗子

一枚或加參苓或以山藥代參苓水煎服入蜜亦可加肉蓯破故紙亦可冬日尤宜用故紙蓋以三

焦者乃下焦元氣生發之根蒂也

升陽益胃養榮湯

當歸

一錢全用隨

白芍

八分炒隨白

人參

七分山梔

甘草

五分如食松菜以蜜代之

白朮

五分木通

五分以漸而減

生薑

三片棗子二枚

粳米

一撮水煎熱服蓋蒼朮山梔大能除鬱因食冷物鬱火於脾胃者故屬脾脾者土也熱伏地中此病

多因血虛而得之也又有胃虛過食冷物鬱過陽氣於脾土之中並宜服之又肉蓯補骨脂二物冬月可服已上三方古菴所立鬱門曾纂其畧今更詳之

總方畢

涉世有年
先鋒

